

случая кесарскаго сѣченія. Въ одномъ случаѣ вольнопрактикующій врачъ *Esser*, послѣ неудачной попытки извлечь щипцами низко стоящую головку, удалилъ незрѣлый но съ сильно вздутымъ животомъ плодъ помощью кесарскаго сѣченія по консервативному способу. Больная выздоровѣла.—Во второмъ случаѣ, который произошелъ въ клиникѣ *Chrobak'a*, дѣло было въ общемъ аналогично, только вслѣдствіе тщетныхъ попытокъ къ родоразрѣшенію произведенныхъ еще внѣ клиники присоединились явленія тимпанита, почему клиническій ассистентъ *Ludvig* прибѣгъ къ операци *Porro*. *Ahlfeld* не только подобно всѣмъ, осуждаетъ образъ дѣйствій *Esser'a*, въ случаѣ котораго не было показанія къ кесарскому сѣченію а только къ эвентраціи, но и образъ дѣйствій *Ludvig'a*, исходя изъ того положенія, что при *turpania uteri*, какъ показываютъ его собственныя наблюденія, при которыхъ онъ дѣлалъ промыванія матки 50% спиртомъ прогнозъ вовсе не такъ плохъ, чтобы нужно было рѣшаться на кесарское сѣченіе.

При этомъ *A.* высказывается также противъ права врача произвести операцию по *Porro* (вмѣсто консервативнаго метода) единственно изъ желанія гарантировать больную отъ возможности вторичнаго забеременѣнія.

С. Ю. Хазанъ.

97. *Alfred Hahn*.—*Ein stadium der Placentarentwicklung*.—(*Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. XXXIV Hft. 3*).—Стадій развитія дѣтскаго мѣста.

Авторъ приводитъ новое наблюденіе, подтверждающее, по его мнѣнію, теорію *Keilmann'a*, по которой не только *placenta praevia* но и всякая плацента первоначально развивается на *reflexa*.

С. Ю. Хазанъ.

98. *Ahlfeld*.—*Zur Diagnose der Zwillingschwangerschaft*.—(*Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. XXXIV Hft. 2*).—Къ діагнозу беременности двойнями.

Абсолютно вѣрный діагнозъ беременности двойнями далеко не такъ легокъ, какъ многіе думаютъ, и это обстоятельство особенно наглядно выступаетъ тогда, когда отъ вѣрнаго діагноза зависитъ образъ дѣйствій врача. *A.* недавно наблюдалъ подобный случай. Многорожавшая, у которой прежніе роды вслѣдствіе узкости таза прошли неблагоприятно для дѣтей, пріѣхала въ Марбургскую клинику, по ея счету за мѣсяць до нормальнаго срока беременности, для производства преждевременныхъ

родовъ. Уже первое изслѣдованіе возбудило подозрѣніе, что больная беременна двойнями. А такъ какъ въ случаѣ вѣрности діагноза необходимо было отказаться отъ производства преждевременныхъ родовъ, то постановка вѣрнаго діагноза оказалась настоятельною необходимостью. Этого А. достигъ при помощи уже раньше рекомендованнаго имъ метода одновременнаго выслушиванія сердечныхъ тоновъ плодовъ двумя наблюдателями. Онъ даже заказалъ для этой цѣли особые часы, секундную стрѣлку въ которыхъ можно помощью пружины не только остановить на любомъ мѣстѣ, но и привести до нуля а затѣмъ вновь пустить въ ходъ, при чемъ издается звукъ, дающій другому наблюдателю возможность начать считать въ одинъ и тотъ же моментъ съ первымъ. Въ частной практикѣ, гдѣ нѣтъ подъ рукою опытнаго помощника, приходится, по мнѣнію А., ограничиваться выслушиваніемъ сердечныхъ тоновъ въ двухъ пунктахъ; при этомъ онъ рассказываетъ наблюденный имъ случай, который учитъ, что при этомъ методѣ выслушиванія больная должна какъ можно меньше двигаться, иначе и при одномъ ребенкѣ можно въ двухъ мѣстахъ слышать сердечные тоны неодинаковой частоты—такъ какъ отъ движенія сердечные тоны несомнѣнно ускорятся.

С. Ю. Хазанъ.

99. W. Lesse.—*Em weiterer Fall von Luftembolie bei Placenta praevia.*—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. XXXV Hfl. 2).—**Еще случай воздушной эмболии при placenta braevia.**

Во время производства комбинированнаго поворота съ цѣлью остановить кровотеченіе вслѣдствіе предлежанія дѣтскаго мѣста, въ тотъ самый моментъ, когда была захвачена ножка, пульсъ и дыханіе сразу остановились. Хотя послѣднее сейчасъ же возобновилось, но оно осталось поверхностнымъ, точно также сердечные тоны оказались замедленными и, не смотря на всѣ средства (массажъ сердечной области, искусственное дыханіе, вливаніе физиологическаго раствора поваренной соли и т. д.) больная черезъ 5 часовъ умерла.

С. Ю. Хазанъ.

100. Vahle.—*Ueber das Vorkommen von Streptokokken in der Scheide Gebärender.*—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. XXXV Hfl. 2).—**О существованіи стрептококковъ во влагалищѣ роженицъ.**

Если возможность существованія стрептококковъ во влагалищѣ признается все больше и больше, то все же существуютъ еще авторы, которые эту возможность отрицаютъ. Разногласіе господ-