

в) А н г л і й с к о й.

I. Dr. Leith (Edinburgh).—*A Case of Carcinoma of the Uterus Complicated by Pregnancy.*—Lancet, 1896, April 4, p. 922.

II. Dr. W. H. Baker.—*Cancer of the Cervix, complicated with Pregnancy.*—(Boston med. and surg. Journ., 1896, III; American Journ. of obstetrics, 1896, May, p. 760).—**Ракъ шейки осложненный беременностью.**

III. Dr. Cordier.—*Cancer of the Uterus, complicated with Pregnancy; Indication for operation.*—(New-York med. Journ., 1896, April 18, p. 522).—**Ракъ матки у беременной; показаніе къ операциі.**

I. 29—лѣтняя, рожавшая 2 раза; изъ семьи, въ которой, ни рака, ни туберкулѣза не было. Первые роды $1\frac{1}{2}$ года назадъ мертво-рожденнымъ ребенкомъ, при родахъ произошелъ разрывъ шейки, но зашить. Иногда у ней являлись боли и крови; но не смотря на это наступила 2-я беременность; вторые роды длились 5 дней, ребенокъ мертвый. Изслѣдованіе черезъ 5 мѣсяцевъ послѣ родовъ обнаружило раковое пораженіе шейки, хотя до операциі dr. Leith колебался въ діагнозѣ: быстрое истощеніе, боли, твердость и неподвижность шейки говорили за ракъ; но молодой возрастъ, отсутствіе кровотеченій, сочувственныхъ страданій мочеваго пузыря и прямой кишкѣ говорили противъ злокачественности болѣзни. Операция произведена д-ромъ Ramsey Smithомъ, въ его лѣчебницѣ. Подкожное вирѣскиваніе морфія и хлороформированіе, выскабливаніе больной ткани ногтями и ложечкой, удалено $\frac{4}{5}$ всей ткани матки. Кровотеченіе было обильное, смазываніе полости матки карболовымъ растворомъ и тампонада іодоформенной марлей. Выздоровленіе.—Авторъ говоритъ, что ракъ начался у этой больной послѣ первыхъ родовъ, на почвѣ разорванной шейки.

II. Въ случаѣ Baker произведена hysterectomy на 4-мъ мѣсяцѣ беременности. Объ исходѣ ничего не сказано.

III. Въ случаѣ д-ра Cordier произведено на 3-мъ мѣсяцѣ беременности вырѣзаніе всей матки, окончившееся выздоровленіемъ.

По этому поводу Cordier собралъ изъ американской литературы свѣдѣнія о 27 такихъ случаяхъ. Изъ 27 беременныхъ съ пораженіемъ шейки ракомъ, упоминаемыхъ Wan der Veer'омъ (Albany) 5 умерли во время родовъ не разрѣшившись, а 9—умерли въ послѣродовомъ періодѣ. Другой авторъ собралъ свѣдѣнія о 34 случаяхъ рака у беременныхъ съ 52% смертности.

Авторъ приводить нѣсколько тезисовъ о необходимости раннаго діагноза и вырѣзанія раково-перерожденной шейки, изъ которыхъ привожу 5-й: опытный хирургъ виравѣ произвести операцию даже въ сомнительномъ случаѣ. По поводу сообщенія *Cordier*, сдѣланномъ на годичномъ съѣздѣ врачей въ Чикаго въ апрѣль 1896 г., Dr. *Kyan* рассказалъ про одинъ случай рака шейки у беременной на 4-мъ мѣсяцѣ, въ которомъ произведена была ампутація одной шейки, безъ перерыва беременности; разрѣшеніе наступило въ срокъ и прошло благополучно.

Byron Robinson (Chicago) и *Dunning* (Indianapolis) указали, что микроскопомъ не всегда можно опредѣлить свойство новообразованія и что вырѣзаніе одной шейки, въ виду частыхъ рецидивовъ рака въ рубцѣ, не гарантируетъ выздоровленія, а потому hysterectomy болѣе полезна, чѣмъ ампутація шейки.

(Припомню здѣсь недавнее сообщеніе проф. *Olshausen*'а о полученныхъ имъ блестящихъ результатахъ въ оперативномъ лѣченіи рака матки: Uber d. Prinzipien der Vaginale Extirpation des Carcinomatosen Uterus. Therapeutische Wochenschrift w. Dr. *Schnirer*, 1896 г., № 24).

M. Гинзбургъ.

110. I. Dr. G. H. Freeman. **Sabcutaneous Emphysema, occurring during Labour.**—(Lancet, 1896, March 14, p. 705).—**Подкожная эмфизема, развившаяся во время родовъ.**

II. Dr. Macé. *Idem.*—(The American Journ. of obstetrics etc, 1896, May, p. 763).—**О томъ же.**

I. Dr. *Fr.* былъ приглашенъ къ 1 роженицѣ въ 6 ч. утра 1 декабря 1895 г. Въ периодѣ раскрытия схватки были очень сильны, роженица сильно натуживалась, задерживая дыханіе. За часъ до рожденія ребенка лицо роженицы распухло, стало напряженнымъ; но она прикрывшись платкомъ, лежала покойно и д-r *Fr.* не обратилъ на сказанное явленіе должнаго вниманія. По окончаніи родовъ *Fr.* увидѣлъ, что лицо родильницы, ея шея, плечи и грудь до 3-го ребра были сильно распухшими, при давленіи получался трескъ воздушныхъ пузырьковъ, словомъ, у ней была подкожная эмфизема, родильница жаловалась на трудность дыханія и чувство сжатія въ горлѣ. Въ моментъ выхожденія послѣда родильница понатужилась и вздутие лица усилилось до тяжелой степени. Давленіе на шею облегчало болѣйшую; по выхожденіи послѣда, эмфизема начала уменьшаться и къ ночи прошла, а на другое утро не осталось и слѣдовъ ея.