

Авторъ приводитъ нѣсколько тезисовъ о необходимости ранняго діагноза и вырѣзанія раково-перерожденной шейки, изъ которыхъ привожу 5-й: опытный хирургъ въправѣ произвести операцію даже въ сомнительномъ случаѣ. По поводу сообщенія *Cordier*, сдѣланномъ на годичномъ съѣздѣ врачей въ Чикаго въ апрѣлѣ 1896 г., *Dr. Kyau* разсказалъ про одинъ случай рака шейки у беременной на 4-мъ мѣсяцѣ, въ которомъ произведена была ампутація одной шейки, безъ перерыва беременности; разрѣшеніе наступило въ срокъ и прошло благополучно.

*Byron Robinson* (Chicago) и *Dunning* (Indianapolis) указали, что микроскопомъ не всегда можно опредѣлить свойство новообразованія и что вырѣзаніе одной шейки, въ виду частыхъ рецидивовъ рака въ рубцѣ, не гарантируетъ выздоровленія, а потому *hysterectomy* болѣе полезна, чѣмъ ампутація шейки.

(Припомню здѣсь недавнее сообщеніе проф. *Olshausen*'а о полученныхъ имъ блестящихъ результатахъ въ оперативномъ леченіи рака матки: *Über d. Principien der Vaginalen Extirpation des Carcinomatösen Uterus. Therapeutische Wochenschrift* w. Dr. *Schnirer*, 1896 г., № 24).

М. Гинзбургъ.

110. I. *Dr. G. H. Freeman. Subcutaneous Emphysema, occurring during Labour.*—(*Lancet*, 1896, March 14, p. 705).—Подкожная эмфизема, развившаяся во время родовъ.

II. *Dr. Macè. Idem.*—(*The American Journ. of obstetrics etc*, 1896, May, p. 763).—О томъ же.

I. *Dr. Fr.* былъ приглашенъ къ 1 роженницѣ въ 6 ч. утра 1 декабря 1895 г. Въ періодѣ раскрытія схватки были очень сильны, роженница сильно натуживалась, задерживая дыханіе. За часъ до рожденія ребенка лицо роженницы распухло, стало напряженнымъ; но она прикрывшись платкомъ, лежала покойно и *d-r Fr.* не обратилъ на сказанное явленіе должнаго вниманія. По окончаніи родовъ *Fr* увидѣлъ, что лицо родильницы, ея шея, плечи и грудь до 3-го ребра были сильно распухшими, при давленіи получался трескъ воздушныхъ пузырьковъ, словомъ, у ней была подкожная эмфизема, родильница жаловалась на трудность дыханія и чувство сжатія въ горлѣ. Въ моментъ выходженія послѣда родильница понатужилась и вздутіе лица усилилось до тяжелой степени. Давленіе на шею облегчало больную; по выходженіи послѣда, эмфизема начала уменьшаться и къ ночи прошла, а на другое утро не осталось и слѣдовъ ея.

II. Въ случаѣ *Masé* (сообщ. въ Париж. акуш. обществѣ въ январѣ 1896 г.) эмфизема произошла часа за два до родовъ: роженица вдругъ почувствовала сильную боль въ грудной желѣзѣ и вслѣдъ за тѣмъ шея и щеки надулись, движеніе вѣками стало затруднительно. *Masé* быстро окончилъ роды щипцами ради не допущенія дальнѣйшаго развитія болѣзни. Эмфизема исчезла медленно, чѣмъ въ 1-мъ случаѣ, а именно въ 2 недѣли.

*М. Гинзбургъ.*

111. 1) Prof Baldy.—A Case of puerperal Thrombosis; Hysterectomy, Recovery.—(The Americ. Journ. of obstetrics ect., may 1896, p. 673).—Послѣродовый тромбозъ; изсѣченіе матки съ выздоровленіемъ

2) Prof Pernose.—Report of a Case of Hysterectomy for acute Puerperal Sepsis, With Recovery.—(Ibidem, p. 678).—Гистеректомія при остромъ послѣродовомъ септическомъ заболѣваніи выздоровленіе.

3) Hirst, Montgomery, Noble.—Въ Transaction of the Section on gynecologie, College of phisicians of Philadelphia.—О томъ же.—(Ibidem, p. 710—719).

Въ декабрѣ 1894 г. проф. *Baldy* сообщилъ филадельфійскому Медицинскому Обществу о 5-и случаяхъ названной операціи, произведенной имъ и разными другими членами общества; въ маѣ 1895 г. число этихъ операцій возросло до 19-и съ семью выздоровленіями. В ссылается на проф. *Lusk'a*, который называетъ эту операцію такою, которой предстоитъ *будущность*, считая ее особенно полезною при раннихъ диагнозѣ и производствѣ ея. *Baldy* приводитъ новый случай ея, вотъ подробности его.

Г-жа G., родила 2 ребенка 19 декабря 1895 года, роды шли медленно, окончены щипцами (домашнимъ врачомъ семейства G.). По причинѣ долгой задержки послѣда и огромной кровопотери, до обмороковъ, ручное отдѣленіе плаценты по кускамъ, вслѣдствіе приращенія ея, 21 декабря жаръ, промывка матки; слѣдующіе дни тоже, т. е. ежедневно лихорадка, промывка матки, 7 января приглашеніе проф. *Baldy* на консультацію. Онъ выскоблилъ матку и основательно промылъ ее. Жаръ не прекратился, почему домашній врачъ еще разъ поскоблилъ матку и промылъ; а когда это не помогло, онъ отправилъ больную въ клинику *Baldy* 10 января. Тамъ B. произвелъ изсѣченіе матки; до операціи температура 102°, т. е. 38,8° C., матка была мягка, Фаллопьевы трубы и яичники—здоровы; ампутація шейки произведена низко съ вырѣза-