

118. Э. М. Собъстянскій.—Удаленіе матки чрезъ влагалище съ замѣною лигатуръ кровоостановливающими пинцетами.—(Проток. Кавк. Мед. Общ. 1896, № 9).

Описавъ способы удаленія матки чрезъ влагалище при помощи пинцетовъ и указавъ преимущества пинцетовъ передъ лигатурами (простота, скорость и болѣе легкая техника операциі: послѣ-операционный періодъ короче) и ихъ недостатки (возможность кровотеченія послѣ снятія пинцетовъ, пролежни на брюшиномъ покровѣ кишечъ и во влагалищѣ), авторъ переходитъ къ описанію своего случая *canceris colli uteri*, гдѣ произведена имъ была *extirratio uteri per vaginam* по способу *Réan—Doyen'*a. Интересъ этого случая заключается въ томъ, что черезъ 10 минутъ послѣ снятія пинцетовъ (пинцеты сняты спустя 2 сутокъ послѣ операциі) получилось чрезвычайно обильное артеріальное кровотечение, едва нестоившее жизни больной. Вновь наложено 7 пинцетовъ, которые и сняты черезъ 56 часовъ послѣ ихъ наложенія. Больная поправилась. Кровотечепіе у данной больной авторъ, на основаніи нѣкоторыхъ данныхъ, объясняетъ гемофіліей и замѣчаетъ, что методъ, не могущій обніять всѣхъ случаевъ, допускающей исключенія, не можетъ считаться безупречнымъ, тѣмъ болѣе, что для опредѣленія гемофіліи у насть не всегда бываетъ достаточно данныхъ.

119. М. Е. Автандиловъ.—Случай консервативного кесарскаго съченія.—(Прот. Кавк. Мед. Общ. 1896, № 7).

Со стороны спиннаго хребта констатированъ былъ кифоско-ліозъ. Размѣры таза: 31, 31, 32, 16, 9, соnj. vera $6\frac{1}{2}$ —7 см. Здѣсь можно было имѣть въ виду симфизеотомію, перфорацію или кесарское съченіе. Въ данномъ случаѣ симфизеотомія едва дала бы хорошій результатъ въ виду приведенныхъ цифръ размѣровъ таза, т. к. эта операциія увеличиваетъ размѣры таза главнымъ образомъ въ поперечномъ направленіи и почти не измѣняетъ прямого размѣра. Не желая производить перфорацію живого плода, авторъ произвелъ кесарское съченіе, которое и дало благопріятный исходъ. Въ заключеніе авторъ выражаетъ убѣжденіе, что недалеко время, когда прободеніе головки у живого ребенка будетъ совершенно оставлено, по крайней мѣрѣ въ городахъ, гдѣ существуютъ больницы, и къ перфораціи живого ребенка будутъ прибегать въ исключительныхъ случаяхъ и главнымъ образомъ въ сельской практикѣ.