

118. Э. М. Собѣстіанскій.—Удаленіе матки чрезъ влагалище съ замѣною лигатуръ кровоостанавливающими пинцетами.—(Проток. Кавк. Мед. Общ. 1896, № 9).

Описавъ способы удаленія матки чрезъ влагалище при помощи пинцетовъ и указавъ преимущества пинцетовъ передъ лигатурами (простота, скорость и болѣе легкая техника операціи: послѣ операціонный періодъ короче) и ихъ недостатки (возможность кровотеченія послѣ снятія пинцетовъ, пролежни на брюшинномъ покровѣ кишекъ и во влагалищѣ), авторъ переходитъ къ описанію своего случая *canceris colli uteri*, гдѣ произведена имъ была *extirpatio uteri per vaginam* по способу *Péan—Doyle*'a. Интересъ этого случая заключается въ томъ, что черезъ 10 минутъ послѣ снятія пинцетовъ (пинцеты сняты спустя 2 сутокъ послѣ операціи) получилось чрезвычайно обильное артеріальное кровотеченіе, едва нестоившее жизни больной. Вновь наложено 7 пинцетовъ, которые и сняты черезъ 56 часовъ послѣ ихъ наложенія. Больная поправилась. Кровотеченіе у данной больной авторъ, на основаніи нѣкоторыхъ данныхъ, объясняетъ гемофиліей и замѣчаетъ, что методъ, не могущій обнять всѣхъ случаевъ, допускающій исключенія, не можетъ считаться безупречнымъ, тѣмъ болѣе, что для опредѣленія гемофиліи у насъ не всегда бываетъ достаточно данныхъ.

119. М. Е. Автандиловъ.—Случай консервативнаго кесарскаго сѣченія.—(Прот. Кавк. Мед. Общ. 1896, № 7).

Со стороны спиннаго хребта констатированъ былъ кифосколиозъ. Размѣры таза: 31, 31, 32, 16, 9, conj. vera $6\frac{1}{2}$ —7 см. Здѣсь можно было имѣть въ виду симфизеотомию, перфوراцію или кесарское сѣченіе. Въ данномъ случаѣ симфизеотомія едва дала бы хорошій результатъ въ виду приведенныхъ цифръ размѣровъ таза, т. е. эта операція увеличиваетъ размѣры таза главнымъ образомъ въ поперечномъ направленіи и почти не измѣняетъ прямого размѣра. Не желая производить перфораціи живого плода, авторъ произвелъ кесарское сѣченіе, которое и дало благоприятный исходъ. Въ заключеніе авторъ выражаетъ убѣжденіе, что недалеко время, когда прободеніе головки у живого ребенка будетъ совершенно оставлено, по крайней мѣрѣ въ городахъ, гдѣ существуютъ больницы, и къ перфораціи живого ребенка будутъ прибѣгать въ исключительныхъ случаяхъ и главнымъ образомъ въ сельской практикѣ.