

120. С. К. Оленинъ.—Десять чревосѣченій, произведенныхъ мною въ Гинекологическомъ отдѣленіи Тамбовской губернской земской больницы во вторую половину 1895 г.—(Прот. Тамб. Мед. Общ. 1896, № 1—7).

Показаніями для этихъ операцій служили: полное выпаденіе матки, фиброміома матки, *salpingitis hypertrophica dextra cum retroversione uteri fixata*, новообразование мочевого пузыря и новообразования яичниковъ. Авторъ подробно описываетъ обстановку своихъ чревосѣченій, техническую сторону производства этихъ операцій, послѣоперационное теченіе и исходы.

121. С. К. Оленинъ.—О примѣненіи формалина въ акушерствѣ.—(Прот. Тамб. Мед. Общ. 1896, № 1—7).

Въ послѣднее время въ родильномъ отдѣленіи Тамбовской губернской земской больницы авторъ сталъ примѣнять вмѣсто сулемы предложенный для акушерской практики *Winckel*'емъ формалинъ крѣпостью 1:1000 и 1:500 для обмыванія наружныхъ половыхъ органовъ и дезинфекціи влагалища у рожениць и родильницъ, а также для дезинфекціи рукъ ухаживающаго персонала. 35 случаевъ родовъ, проведенныхъ съ помощью формалина, прошли удовлетворительно. Авторъ приходитъ къ заключенію, что антисептическое дѣйствіе формалина достаточно по крайней мѣрѣ для веденія нормальныхъ родовъ и послѣродового періода, по чему формалинъ въ этихъ случаяхъ можетъ успѣшно замѣнить сулему, а по своей безопасности долженъ быть предпочтенъ сулемѣ; формалинъ также удобенъ и доступенъ по своей дешевизнѣ и въ бѣдной практикѣ; единственный его недостатокъ—это довольно сильный запахъ, ощущаемый и въ сильномъ разведеніи, зато онъ, какъ вещество безцвѣтное и не ѣдкое, не портитъ инструментовъ, бѣлья и рукъ.

122. А. Н. Ховринъ.—Примѣненіе гипнотическаго внушенія въ одномъ случаѣ родовъ.—(Прот. Тамб. Мед. Общ. 1896, № 1—7).

Больная страдала истеро-эпилепсіей. Примѣненіе металло-терапии совмѣстно съ внушеніемъ значительно поправило состояніе больной; затѣмъ больная забеременѣла. Уже первыя родовыя схватки предвѣщали появленіе истеро-эпилептическихъ припадковъ. Ей внушено было, чтобы она спала спокойнымъ сномъ, не ощущала бы ни малѣйшихъ болей при схваткахъ и чтобы проснулась по первому приказанію. Больная заснула. При наруж

номъ изслѣдованіи ясно ощущалось сокращеніе матки и маточное устье постепенно открывалось своимъ чередомъ. Больная разбужена при внушеніи: „теперь Вы должны проснуться, чувствовать себя бодрою, здоровою, никакихъ болей до самаго послѣдняго момента родовъ ощущать не будете; Вы должны чувствовать себя такъ, какъ я вамъ говорю; теперь проснитесь и чувствуйте себя здоровою“.

Въ дальнѣйшемъ теченіи родовъ больная при каждой потугѣ впадала въ забытіе и быстро приходила въ себя при прекращеніи схватокъ и только за 12—15 минутъ до выхода головки изъ половой щели роженица вдругъ почувствовала сильныя боли и стала кричать.

Н. Р.

123. **А. Я. Шварцъ.**—Случай первичнаго пораженія туберкулезомъ внутреннихъ половыхъ органовъ у женщины.— (Южно-русская Мед. Газ. 1897, № 4).

Авторъ описываетъ случай, гдѣ при посмертномъ вскрытіи одной женщины найдено туберкулезное пораженіе матки, трубъ, яичниковъ, плевры, печени, брюшины, мезентеріальныхъ железъ и легкихъ. Подробно разсмотрѣвъ степень распространенія туберкулезнаго процесса на отдѣльныхъ органахъ въ данномъ случаѣ, принявъ во вниманіе анамнезъ больной и рядъ другихъ соображеній, авторъ приходитъ къ заключенію, что первичнымъ мѣстомъ туберкулеза являются здѣсь organa genitalia.

Н. Рачинскій.

124. **Д. И. Ширшовъ.**—Къ вопросу о лѣченіи рака матки и эрозій влагалищной части вытяжкой бородавника.— (Большая газета Боткина, 1897, № 3).

Отмѣтивъ случаи изъ русской и иностранной литературы о примѣненіи бородавника при ракахъ матки и указавъ на противорѣчивые результаты приведенныхъ наблюденій, авторъ описываетъ свой случай canceris canalіs cervicalis съ инфильтраціей обоихъ боковыхъ сводовъ. Вначалѣ примѣнялись тампоны, смоченные въ смѣси вытяжки бородавника съ глицериномъ въ пропорціи 1:2. Втеченіи первой недѣли можно было замѣтить нѣкоторое улучшеніе въ ходѣ процесса. Произведенное затѣмъ впрыскиваніе слабого раствора вытяжки въ маточную шейку вызвало послѣдовательно сильныя боли въ нижней части живота. Съ цѣлью привести лекарство въ болѣе интимное соприкосновеніе съ тканями, влагалищная часть матки разсѣчена пятью радіальными