

разрѣзами, въ которые вводились тампоны съ растворомъ вытяжки. Мѣстные явленія временно какъ бы улучшились, но затѣмъ из-
 венный процессъ и инфильтрація сводовъ, не смотря на трехне-
 дѣльное примѣненіе бородавника, стали быстро прогрессировать. Микроскопическое изслѣдованіе вырѣзанныхъ въ области зажившей
 язвы частицъ показало поверхностное рубцеваніе канкродной язвы, отчасти заростаніе ея эпителиемъ, значительно измѣненнымъ подъ
 вліяніемъ примѣнявшихся дезинфецирующихъ веществъ и боро-
 давника. На основаніи этого случая, а также на основаніи лите-
 ратурныхъ данныхъ и описанныхъ здѣсь-же авторомъ двухъ наблю-
 деній доцента *Орлова* (послѣднія наблюденія касались эрозій ма-
 точной шейки), авторъ приходитъ къ заключенію, что бородав-
 никъ можетъ давать благопріятный эффектъ только лишь при
 поверхностныхъ раковыхъ изъязвленіяхъ.

125. В. М. Бурлакъ.—Амбулаторное примѣненіе гинеколи-
 ческаго массажа.—(Медицинская бесѣда, 1896, № 19).

Статья представляетъ краткую компиляцію нѣкоторыхъ мо-
 нографій по гинекологическому массажу. Намъ кажется, что въ
 выраженіи „амбулаторное примѣненіе гинекологическаго массажа“
 прилагательное „амбулаторное“ является лишнимъ, т. е. гинеко-
 логическій массажъ и примѣняется, за рѣдкими исключеніями,
 только лишь въ тѣхъ случаяхъ, которые могутъ быть пользованы,
 вообще, амбулаторно, и ради одного гинекологическаго массажа
 нѣтъ надобности помѣщать больныхъ въ лѣчебницы и больницы.

126. Ѳ. И. Вerezкинъ.—Случай corporis alieni vaginae.—
 (Врачебныя записки, 1896, № 11).

Дѣло касается 15-лѣтней дѣвушки, поступившей въ больницу
 съ жалобой на боль въ лѣвой ногѣ и внизу живота. Во влага-
 лищѣ найденъ винный стаканъ, края котораго задерживались ни-
 сходящими вѣтвями лонныхъ и восходящими сѣдалищныхъ ко-
 стей. Такъ какъ стаканъ не могъ быть извлеченъ, то по обѣимъ
 сторонамъ входа въ рукавъ, на границѣ средней и нижней его
 трети, были сдѣланы разрѣзы, направляющіеся къ tubera ischii.
 Стаканъ извлеченъ, разрывы зашиты.

127. В. Келли.—Случай внутриутробнаго зараженія плода
 брюшнотифозными бациллами.—(Врачебныя записки, 1896 № 16).

У тифозной больной произошелъ выкидышъ двойнями, мерт-
 выми. У одного изъ плодовъ при вскрытіи бросилось въ глаза

рѣзкое жировое перерожденіе печени и набуханіе селезенки. Изслѣдованіе микроскопическое на бактеріи препаратовъ изъ печени, селезенки и крови, взятой изъ полрой вены, а также характеръ разволокъ указали на присутствіе брюшно-тифозныхъ палочекъ. Послѣдъ съ виду былъ совершенно нормаленъ.

128. Н. А. Мусатовъ.—Три случая неоперируемаго рака матки подѣ вліяніемъ лѣченія чистотѣломъ.—(Врачебныя записки, 1896, № 17).

Тремъ больнымъ съ раковымъ пораженіемъ матки производились черезъ день и рѣже впрыскиванія въ пораженныя мѣста раствора вытяжки чистотѣла, тампонація растворомъ вытяжки, иногда же чистотѣлъ давался внутрь. Нерѣдко примѣненіе его вызывало лихорадочное состояніе съ ознобомъ, жаромъ и потомъ. Впрыскиваніе стерилизованной вытяжки также давало лихорадку, слѣдовательно, послѣдняя вызывается не микроорганизмами, находящимися въ громадномъ количествѣ въ вытяжкѣ, но продуктами ихъ жизнедѣятельности, а можетъ быть и какими либо другими веществами, входящими въ вытяжку. Выводы изъ наблюденій надъ примѣненіемъ чистотѣла въ описанныхъ случаяхъ: 1) рѣзкое уменьшеніе всѣхъ симптомовъ въ самомъ началѣ лѣченія на довольно продолжительное время; 2) значительное уменьшеніе опухоли; 3) постепенное возвращеніе всей прежней картины страданія не поддающееся уже лѣченію чистотѣломъ. Микроскопическое изслѣдованіе частицъ, взятыхъ изъ мѣстъ, подвергнутыхъ дѣйствію чистотѣла показало: пролиферація поверхностныхъ слоевъ новообразованія и значительно развитая инфильтрація грануляціонными элементами интерстиціальной ткани съ склонностью переходить въ стойкую соединительную ткань. Сравнивая чистотѣлъ съ салициловой кислотой при лѣченіи рака матки, авторъ склоненъ отдать предпочтеніе салициловой кислотѣ.

129. И. К. Юрасовскій.—Случай децидуомы развившейся послѣ пузырнаго заноса.—(Врачебныя записки, 1897, № 1).

Предпославъ литературныя данныя относительно децидуомы, авторъ описываетъ свой случай. Въ декабрѣ 1894 г. въ Басманной больницѣ (Москва) у больной удаленъ пузырный заносъ. Въ сентябрѣ 1896 г., она вновь поступила въ эту больницу съ кровотеченіями, которыя, по ея словамъ, почти не прекращались со времени удаленія заноса. Матка по величинѣ соответствуетъ 2 $\frac{1}{2}$ —