

131. М. Я. Кельберъ.—Нѣсколько наблюденій надъ дѣйствіемъ вытяжки бородавника (*chelidonii majorigis*) при ракъ влагалищной части матки.—(Врачъ, 1896, № 46)

У 4 больныхъ съ неоперируемыми раками матки примѣнялась вытяжка бородавника ежедневно, или черезъ день въ видѣ впрыскиваній (въ среднемъ, каждая больная получила не меньше 15 впрыскиваній); кромѣ того у всѣхъ больныхъ бородавникъ примѣнялся внутрь и въ видѣ тампоновъ. Лихорадка при примѣненіи бородавника получалась рѣдко; не удалось также подмѣтить ни одного признака, имѣющаго что либо специфическое для его дѣйствія. Выводы изъ наблюденій автора: видимыя измѣненія опухоли не идутъ далѣе поверхностныхъ слоевъ ея, претерѣвающихъ въ однихъ случаяхъ нагноеніе, въ другихъ—нѣчто, напоминающее ороговѣніе (высыханіе?); рассыванія и уменьшенія пропитыванія нѣтъ; дѣйствіе препарата всегда сильнѣе въ началѣ, затѣмъ оно постепенно слабѣетъ, и опухоль дойдя до извѣстной степени измѣненій, уже мало реагируетъ на дальнѣйшее лѣченіе; дѣйствіе бородавника, повидимому, проявляется рѣзче въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ новообразованіе ткани преобладаетъ надъ изъязвленіемъ, такъ что, напр., твердая ограниченная раковая язва съ мозолистыми краями будетъ менѣе реагировать на впрыскиванія, нежели формы, характеризующіяся разрастаніемъ ткани на подобіе цвѣтной капусты; въ первомъ случаѣ дѣйствіе выразится не уменьшеніемъ язвы, а временнымъ только измѣненіемъ поверхностнаго слоя, которое авторъ назвалъ ороговѣніемъ, во второмъ случаѣ происходитъ уменьшеніе опухоли путемъ поверхностнаго нагноенія и удаленія гнойныхъ пленокъ; что же касается до общаго состоянія, то трудно было замѣтить какое нибудь улучшеніе, которое можно было бы всецѣло отнести на счетъ лѣкарства.

132. А. П. Аристовъ.—Маточное зеркало для „завѣдомыхъ сифилитокъ“.—(Врачъ, 1896, № 50).

Дабы избѣжать при изслѣдованіи и осмотрѣ здоровыхъ субъектовъ всякаго рода зеркалъ (маточныхъ, прямо-кишечныхъ, носовыхъ, ушныхъ, для мочеиспускательнаго канала), употребляющихся и у сифилитокъ, авторъ предлагаетъ ввести во всеобщее употребленіе для завѣдомыхъ сифилитокъ особыя зеркала, которыя никогда и нигдѣ не могли бы быть смѣшиваемы и которыя быстро и безошибочно можно было бы отличать среди другихъ ему подобныхъ посредствомъ зрѣнія и осязанія; съ этою цѣлью