

бительнаго на 2-й день; температура и пульсъ были нормальны. На 3 сутки послѣ операции (черезъ 56 часовъ) при  $t^0$  въ 37,2 пульсъ поднялся до 120, больная начала заговариваться, за тѣмъ у ней развился приступъ острой маніи, длившійся всего одинъ часъ; слѣдующіе 48 часовъ она пребыла въ психически не нормальномъ состояніи, хотя и небуйномъ; психозъ совершенно успокоился черезъ 72 часа отъ момента появленія его. Дальнѣйшее выздоровленіе шло нормальнымъ путемъ, на 20-й день оперированная могла сидѣть, а на 33-й день она уѣхала домой совершенно здоровой. Послѣоперационное помѣшательство обыкновенно длится 2—3 недѣли.

*М. Гинзбургъ.*

140. Prof. J. W. Irion (Fort Worth University, Texas).—A. Case of precocious menstruation.—(New-York med. Journ., 15 August 1896, p. 227).—Случай ранней менструаціи.

10 октября 1895 г. проф. *Irion* былъ при родоразрѣшеніи одной дамы, нѣмки по происхожденію. Новорожденная дѣвочка вѣсила 9 фунтовъ. 17 октября д-ра *Irion*'а попросили осмотрѣть новорожденную по случаю появленія у нея кровянистыхъ выдѣленій изъ влагалища Эти крови длились 4 дня и никакого дурнаго вліянія на здоровье ребенка не оказывали. Въ декабрѣ у ребенка не было кровей, но въ соотвѣтствующія числа у него появились нервные припадки и сыпь на всемъ тѣлѣ, постепенно въ нѣсколько дней исчезнувшая; мать передавала, что наканунѣ появленія сыпи она выкупала ребенка въ болѣе прохладной водѣ, чѣмъ обыкновенно, что и могло задержать наступленіе регулъ. Въ январѣ и въ слѣдующіе мѣсяцы регулы появлялись у ребенка совершенно правильно. Грудныя желѣзы и лобокъ были у ребенка болѣе развиты, чѣмъ вообще у дѣтей его возраста. Прикосновеніе къ груднымъ желѣзамъ въ дни менструаціи, повидимому, причиняло ребенку боль.

У матери ребенка регулы появились въ 13 лѣтъ; сестеръ у ребенка небыло.

*М. Гинзбургъ.*

141. Dr. Helm, почетный хирургъ универс. клиники въ Манчестерѣ.—Intra-cervical injection of Glycerine; a Modification of Peltzer's Method of Inducing premature Labour.—(Lancet, 3 Oct., 1896, p. 936).—Впрыскиваніе глицерина въ каналъ шейки матки; видоизмѣненіе способа Peltzer'a для возбужденія искусственныхъ преждевременныхъ родовъ.

Видоизмѣненіе *Helm*'омъ названнаго способа состояло въ томъ, что, имѣя въ виду вызвать преждевременные роды у рахитической