

на пятомъ мѣсяцѣ, вслѣдствіе потягиванія лѣвосторонней кисты яичника. У этой больной отмѣчалось сильное затрудненіе при мочеиспусканіи и рѣзкій отекъ шейки матки. Послѣ удаленія кисты и раскручиванія матки больная совершенно поправилась и доносила до конца; шейка послѣ операциіи приняла нормальные размѣры. Случай *Löhlein'a* единственный въ литературѣ.

*Ф. Веберъ.*

193. Schmorl.—Ueber grosszellige (deciduaähnliche) Wucherungen auf dem Peritoneum und den Ovarien bei intrauteriner schwangerschaft.—О крупноклѣточныхъ разращеніяхъ на брюшинѣ и яичникахъ при беременности.—(Monatsschrift. f. Geburtshilfe u. Gynaecologie 1897. Januar).

Нѣкоторыми авторами описывались при внѣматочной беременности узловатыя мелкія утолщенія и разращенія брюшины малаго таза, которые считались особенно характерными для брюшинной беременности. *Schmorl*, подробно изслѣдовавшій брюшину малаго таза въ цѣломъ рядѣ случаевъ нормальной внутриматочной беременности, скоро пришелъ къ убѣждѣнію, что эти разращенія сплошь и рядомъ встрѣчаются при послѣдней и значитъ не составляютъ ничего характернаго для внѣматочной беременности. Эти разращенія, въ видѣ мелкихъ сѣроватыхъ бархатистыхъ бляжекъ, чаще всего находятся въ excavatio rectouterina и на поверхности яичника. На послѣднемъ эти бляжки макроскопически съ трудомъ опредѣляются вслѣдствіе бугристой поверхности яичника. Передняя поверхность матки, фалопіевые трубы а также остальная часть брюшины обыкновенно остаются неизмѣненными. Подъ микроскопамъ эти разращенія состоятъ изъ крупныхъ одноядерныхъ клѣтокъ съ многочисленными развѣтвляющимися отростками; онѣ имѣютъ большое сходство съ децидуальною тканью. Бляжки эти лежатъ непосредственно подъ эндотелемъ, который обыкновенно хорошо сохраняется. Онѣ развиваются по всей вѣроятности изъ сеединительнотканыхъ клѣтокъ подбрюшинной клѣтчатки. Послѣ окончанія беременности онѣ быстро подвергаются белковому или жировому перерожденію и исчезаютъ безслѣдно. Начало развитія этихъ разращеній совпадало съ самыми первыми стадіями беременности. Для контроля *Schmorl* изслѣдовалъ брюшину въ нѣсколькихъ случаяхъ, гдѣ матка была увеличена новообразованіями, и ни въ одномъ изъ нихъ не нашелъ этихъ разращеній.

*Ф. Веберъ.*