

наступают крайне тяжелыя общія септическія явленія, такъ какъ у насъ до сихъ поръ нѣтъ точныхъ данныхъ, на основаніи которыхъ можно было бы рѣшить, удалять ли матку или придерживаться выжидательнаго метода. Авторъ наблюдалъ цѣлый рядъ случаевъ, гдѣ больныя оправлялись при его консервативномъ способѣ лѣченія, не смотря на существованіе тяжелыхъ общихъ явленій. Въ случаяхъ начавшагося аборта, который не удается остановить, *Abel* также никогда не прибѣгаетъ къ ложкѣ, а старается вызвать сокращенія матки плотной тампонаціею влагалища. Только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ имѣются показанія для спѣшнаго опорожненія матки, онъ производитъ по *Dürssen*'у плотную тампонацію полости ея. Этимъ вызываются весьма сильныя сокращенія матки и обыкновенно по прошествіи нѣсколькихъ часовъ яйцо вмѣстѣ съ тампономъ изгоняются въ полость влагалища. Выскабливаніе матки острой ложкою онъ производитъ только въ случаяхъ затяжнаго геморрагическаго эндометрита, развивающагося послѣ аборта; но и въ этихъ случаяхъ онъ предварительно расширяетъ матку настолько, чтобы палецъ могъ ощупать всю полость ея. *Ф. Веберъ.*

195. *Sferebel*.—*Ein Beitrag zur Lösung der Kaiserschnittfrage* (Arch. f. Gyn. Bd. 52 Hft. 2)—**Къ рѣшенію вопроса о кесарскомъ сѣченіи.**

На основаніи 10 случаевъ кесарскаго сѣченія наблюденныхъ въ Цюрихской клиникѣ за послѣдніе 5½ лѣтъ съ однимъ лишь детальнымъ исходомъ, авторъ выступаетъ въ защиту кесарскаго сѣченія, которое въ послѣднее время было нѣсколько отодвинуто на задній планъ симфизеотоміею. *С. Ю. Хазанъ.*

196. *Leopold*.—*Ausgetragene secundäre Abdominalschwangerschaft nach rupura uteri traumatica im 4. Monat. Laparatomie, Genesung.*—(Arch. f. Gyn. Bd. 52 Hft. 2)—**Срочная брюшная беременность послѣ травматическаго разрыва матки въ 4 мѣсяцѣ. Ляпоротомія. Выздоровленіе.**

Это чуть ли не единственное въ своемъ родѣ наблюденіе касается 42 лѣтней XII рожавшей, у которой первые 8 родовъ, равно какъ родильные періоды прошли совершенно нормально, послѣдніе-же трое оканчивались ручнымъ отдѣленіемъ послѣда и тяжелыми послѣродовыми заболѣваніями. Послѣ послѣднихъ родовъ въ 1886 г. на 37 году жизни больная потеряла регулы, что однако не помѣшало ей черезъ 5 лѣтъ зачать снова. Приблѣзи-