

ніе сосудовъ кровью, и сосудистая стѣнка вслѣдствіе этого пребываетъ въ равномерно увеличенномъ тонусѣ, который имѣетъ своимъ ближайшимъ послѣдствіемъ плохое переполненіе сосудовъ кровью, что въ свою очередь ведетъ за собою атрофію органа.

С. Ю. Хазанъ.

204. Schaeffer.—Ueber Blutergüsse in den Wirbelkanal bei Neugeborenen und deren Ursachen.—(Arch. f. Gyn. Bd. 53 Hft. 2).—О кровоизліяніяхъ въ позвоночный каналъ у новорожденныхъ и объ ихъ причинахъ.

Поводомъ къ настоящему изслѣдованію послужилъ возбужденный *Knapp*'омъ (Centr. f. Gyn. 1896 № 28) вопросъ о вліяніи метода *Schultze* при оживленіи мнимоумершихъ дѣтей на происхожденіе кровоизліяній въ позвоночный каналъ. Хотя авторъ вполне соглашается съ заключеніемъ *Knapp*'а что надлежащимъ образомъ выполненныя даже многочисленныя качанія не необходимо влекутъ за собою разбираемыя кровоизліянія, онъ для изученія ближайшихъ причинъ этихъ кровоизліяній тѣмъ не менѣе предпочелъ воспользоваться матеріаломъ вскрытій того времени, которое предшествовало введенію метода *Schultze*. Выводы, къ которымъ приходитъ авторъ на основаніи 17 протоколовъ вскрытій имѣютъ не только теоретическій но и практический интересъ. Оказывается именно, что при асфиксіи равно какъ при недоношенности плода каждое болѣе сильное механическое вмѣшательство въ родовую актъ, въ особенности-же извлеченіе можетъ имѣть своимъ послѣдствіемъ возникновеніе разбираемыхъ кровоизліяній. Вотъ почему авторъ на ряду съ другими предосторожностями (умѣлое наложеніе щипцовъ, предупрежденіе инфекціи новорожденного) горячо ратуетъ за замѣну приѣма *Mauriceau-Smellie-Veit* приѣмомъ выдавливанія головки, предложеннымъ *Wiegand*'омъ, *A. Martin*'омъ и *v. Winkel*'емъ.

С. Ю. Хазанъ.

Редакторы: { Л. Личкусъ.
К. Славянскій.
Д. Оттъ.