

# РЕФЕРАТЫ.

## Обзоръ Акушерско-Гинекологической литературы.

### а) Русской.

1. А. Валовъ.—Акушерская помощь при родахъ у русскихъ инородцевъ.—(Еженедѣльникъ, 1896 г. № 35, стр. 501).

Авторъ даетъ бѣглый очеркъ разныхъ приѣмовъ, которыми пользуются инородцы, какъ при родахъ, такъ и при лѣченіи женскихъ болѣзней. Свѣдѣнія эти авторъ почерпнулъ почти исключительно у русскихъ авторовъ, не указывая (къ сожалѣнію) заглавія цитируемыхъ имъ сочиненій. Онъ отмѣчаетъ между прочимъ, что, несмотря иной разъ на варварскіе приѣмы при родахъ, послѣдніе въ общемъ у инородцевъ протекають удовлетворительно. Это объясняется физиологическими особенностями организма нецивилизованныхъ народовъ: правильностью костяка, жизненностью тканей.

*Н. Какушкинъ.*

2. В. А. Ельяшевичъ.—Случай эклампсiи роженицы съ амаврозомъ.—(Проток. засѣд. Общ. врачей восточной Сибири въ гор. Иркутскѣ. 9 декабря 1895 г. стр. 73).

Больная 29 лѣтъ, беременна въ четвертый разъ. Во всѣхъ предшествующихъ беременностяхъ и въ настоящую больная имѣла отеки конечностей. За 8—9 дней до опредѣленнаго конца беременности при сильнѣйшей головной боли у нея быстро развилась слѣпота и черезъ нѣсколько часовъ начались экламптические припадки. Роды окончены поворотомъ и извлеченіемъ живого плода. Всего было, до и послѣ родовъ, 15 припадковъ съ тяжелымъ коматознымъ состояніемъ. Примѣнялось кровопускание (пьявки за уши), narcotica и пилокарпинъ. Послѣ прекращенія припадковъ зрѣніе

постепенно возстановилось. Причиной слѣпоты въ этомъ случаѣ, какъ показала офтальмоскопъ, была *neuro-retinitis acuta albuminurica*.

Н. Какушкинъ.

3. В. Е. Розенцвейгъ.—Влагалищный электродъ д-ра Рачинскаго.—(Врачъ, 1896 г. № 36, стр. 992).

Электродъ этотъ представленъ Акуш.—Гинекол. Обществу въ Спб. еще въ мартѣ 1895 г. и уже описанъ въ „Журналѣ Акуш. и Жен. Бол.“ (1895 г. стр. 404). Авторъ настоящей статьи доволенъ результатами примѣненія этого электрода и снова описываетъ его. Онъ считаетъ его удобнымъ лишь для наведеннаго тока,

Н. Какушкинъ.

4. Н. Е. Кушевъ.—Случай выпаденія слизистой оболочки женской уретры.—(Врачъ, 1896 г. № 34, стр. 937).

Чаще всего это страданіе наблюдается у дѣтей и старухъ при общей слабости, истощеніи, также при долгомъ существованіи катарра мочевого пузыря. Въ случаѣ автора, у 12 лѣтней, малокровной дѣвочки, выпаденіе случилось внезапно. Выпавшая часть съ китайское яблоко, съ небольшимъ перехватомъ у основанія поверхность опухли красноватая, покрытая гризною сѣрымъ налетомъ, легко кровоочитъ; въ срединѣ опухли углубленіе ведущее въ мочевой пузырь. Лѣчение состояло въ обмываніи выпавшей части 2% борнымъ растворомъ и въ смазываніи таниномъ глицериномъ. Больная поправилась.

Н. Какушкинъ.

5. А. Р. Рымина.—Изъ ста операций произведенныхъ въ гинекологическомъ отдѣленіи Обуховской больницы.—(Сообщ. Проток. Засѣданій Спб. Мед. Общ. за 1895 г. Спб. 1896, стр. 38).

Кратко описаны пять чревосѣченій, произведенныхъ по поводу кожевика яичника (2 случая), многополостной кисты яичника (1 случай) и вѣматочной (трубной) беременности (2 случая). Въ одномъ изъ двухъ послѣднихъ случаевъ вѣматочной беременности имѣла мѣсто и двухмѣсячная маточная беременность, окончившаяся на 11 сутки послѣ операціи выкидышемъ; въ этомъ случаѣ непосредственнымъ поводомъ къ чревосѣченію послужило внутреннее кровотеченіе, вслѣдствіе разрыва трубы. Въ этой-же статьѣ описаны три случая влагалищнаго удаленія матки, два по поводу рака шейки и одинъ по поводу саркомы матки. Всѣ описанные въ статьѣ случаи окончились выздоровленіемъ.

Н. Какушкинъ.