

# РЕФЕРАТЫ.

## Обзоръ Акушерско-Гинекологической литературы:

### а) Русской.

143. **К. Андріашевъ.**—Случай трубной беременности.—(Прот. И. Виленск. Мед. Общ. 12 декабря 1896 года. Стр. 247).

Описанъ собственно патолого-анатомическій препаратъ, добытый при вскрытіи трупа 20-лѣтней женщины, умершей на 5 мѣсяцѣ беременности при признакахъ внутренняго кровотеченія. Оказался разрывъ лѣвой трубы съ выпаденіемъ плода въ брюшную полость. Другихъ отклоненій отъ нормы въ половомъ аппаратѣ не было.

*Н. Какушкинъ*

144. **Я. Е. Выгодскій.**—Четыре случая *polypeuritis puerperalis gravigarum*.—(Проток. И. Виленск. Мед. Общ. 12 февраля 1896 года. Стр. 78).

1) 28 лѣтъ. Беременность (2-ая) прорвана на 2 мѣсяцѣ по причинѣ неукротимой рвоты. Примѣнено выскабливаніе. Никакихъ воспалительныхъ осложненій. Къ концу 2 недѣли послѣ выкидыша—боли въ икрахъ и голеняхъ, затѣмъ явленія полупаралича и атрофіи мышцъ. Выздоровленіе съ помощью массажа и ваннъ въ теченіе 3 мѣсяцевъ. 2) 33 лѣтъ. Послѣ 8-хъ срочныхъ родовъ задержаніе оболочекъ и прибавочнаго пальца, котораго удалены рукой. На 10-й день, при высокой температурѣ, боли въ нижнихъ конечностяхъ, главнымъ образомъ въ мѣстахъ выходненія нервовъ. Пониженіе сухожильныхъ рефлексовъ и электромускульной силы. Выздоровленіе черезъ 5 мѣсяцевъ (францезсбадскія грязи).—3) 49 лѣтъ. 13-ая беременность окончилась

выкидышемъ. Задержаніе и удаленіе остатковъ яйца. На 8-й день картина сѣдалищной невралгіи, затѣмъ боли въ бедреномъ нервѣ и прочихъ; полупараличъ; общія нервныя явленія; принесли пользу только грязныя ванны, и то едва черезъ годъ.— 4) 36 лѣтъ. Искусственный выкидышъ на 4-мъ мѣсяцѣ 4-й беременности по причинѣ неукротимой рвоты. Лихорадка, боли въ ногахъ, полупараличъ, атрофія, отсутствіе колѣнныхъ рефлексовъ. Улучшеніе подѣ влияніемъ массажа и теплыхъ ваннъ. Авторъ полагаетъ, что полинейритъ беременныхъ и родильницъ есть инфекціонная болѣзнь *sui generis*; при послѣдующихъ беременностяхъ она обыкновенно не повторяется. *Н. Какушкинъ.*

145. **И. М. Влохъ.**—Случай *uterus didelphys et vaginasepta completa*.—Проток. И. Виленск. Мед. Общ. 12 сентября 1896 года. Стр. 139).

Больная 28 л., изъ здоровой семьи, жалуется на безплодіе. Мѣсячныя съ 14 лѣтъ, продолжаются по 5—6 дней каждыя 4 недѣли. Замужемъ 8 лѣтъ; 2 года назадъ, повидимому, имѣла выкидышъ. Дѣвственная плева съ двумя отверстіями: правое пропускаетъ одинъ указательный палецъ, лѣвое—два. Влагалище двойное, перегородка мясистая, въ  $\frac{1}{4}$  сан. толщиной. Правое влагалище менѣе объемисто, чѣмъ лѣвое. Въ сводахъ каждаго развитыя шейки съ овальными отверстіями. На уровнѣ внутренняго зѣва тѣла матокъ расходятся, и соединеніе между ними не опредѣляется. Придатки прощупываются нормальными. Длина полости лѣвой матки  $7\frac{1}{2}$  сант., правой  $6\frac{1}{2}$  сант. и менструируютъ обѣ матки одновременно, крови теряютъ не одинаковое количество. Для изыятія безплодія авторъ предлагаетъ въ описанномъ случаѣ удалить влагалищную перегородку. *Н. Какушкинъ.*

146. **С. П. Шахъ-Пароніанцъ.**—Объ оперативномъ лѣченіи выпаданій матки.—(Медиц. Сборникъ И. Кавказск. Медицин. Общества № 59. Тифлисъ 1896, стр. 89).

Разобравъ всѣ предложенныя для этого способы, авторъ высказывается за способы *Freund'a* и *Lefors-Heigelbauera* при выпаденіяхъ у старыхъ женщинъ и за промежностно-влагалищныя пластическія операціи *Hegar'a*—у молодыхъ. Онъ исключаетъ операцію укороченія круглыхъ связокъ и допускаетъ брюшностѣночное укрѣпленіе матки какъ операцію, совершаемую попутно; для влагалищнаго удаленія матки онъ оставляетъ случаи невравимыхъ выпаденій и случай выпаденій матки, пораженной