

приподнятая влагалищная часть маточной шейки и растянутый задний сводъ грушевиднымъ тѣломъ матки, беременной на 3-мъ мѣсяцѣ. По опорожненіи пузыря матка легко выравилась и беременность дошла до конца. Больная (первобеременная, 19 лѣтъ) съ признаками рахита. Причину ущемленія матки авторъ видитъ въ сильно выдающемся впередъ мысѣ таза, представившемъ препятствіе при ростѣ беременной матки; тяжелая работа брюшного пресса способствовала запрокинутію матки назадъ.

Н. Какушкинъ.

12. Ф. К. Герратъ.—О безъотверстной плевы и способъ ея лѣченія.—(Труды Общ. Курскихъ врачей за 1895 г. Курскъ, 1896, стр. 287).

Безъотверстную плеву авторъ наблюдалъ среди (приблизительно) 10000 прошедшихъ черезъ его руки больныхъ четыре раза. Изъ трехъ случаевъ, которые онъ описываетъ, два наблюдались у двухъ родныхъ сестеръ (четвертый случай онъ наблюдалъ мелькомъ, но этому не приводитъ подробно). *1 случай.* 19 лѣтъ. Haematometra и haematocolpos. Сдѣланъ проколъ а затѣмъ вырѣзанъ овальный кусокъ изъ плевы и на края наложены узловатые швы; промываніе педѣлалось. Выздоровленіе. *2 случай.* 23 лѣтъ, замужняя. Въ анамнезѣ—coitus и правильныя мѣсячныя. Плева безъ отверстій. На операцію не согласилась. *3 случай.* 30 лѣтъ, замужняя, беременна на 3 мѣсяцѣ. Въ анамнезѣ coitus и мѣсячныя. Плева—съ двумя отверстиями, едва пропускающими пуговку зонда; она вдавливается подъ пальцемъ въ видѣ слѣзного мѣшка. Операція, какъ въ первомъ случаѣ, съ благопріятнымъ исходомъ. Въ свое время больная родила.

Кромѣ своихъ, авторъ собралъ изъ литературы еще 16 случаевъ и, сопоставивъ ихъ, пришелъ къ заключенію что операція безъотверстной плевы требуетъ строго безгнилостной обстановки, мѣстнаго или общаго наркоза. Опорожненіе полового канала должно производиться не сразу, на край раны обязательно наложеніе шва; желательно избѣгать промываній полового канала и тампонады.

Н. Какушкинъ.

13. А. Норейко.—Къ вопросу о способахъ оперативнаго лѣченія черезъ влагалище наклоненій и загибовъ матки назадъ.—(Диссерт. Юрьевъ, 1896 г.)

Во введеніи къ своей работѣ авторъ приводитъ статистику смѣщеній матки, рассматриваетъ ортопедическое лѣченіе ихъ и дѣлаетъ бѣглый обзоръ оперативныхъ пособій.