

выкидышемъ. Задержаніе и удаленіе остатковъ яйца. На 8-й день картина сѣдалищной невралгіи, затѣмъ боли въ бедреномъ нервѣ и прочихъ; полупараличъ; общія нервныя явленія; принесли пользу только грязныя ванны, и то едва черезъ годъ.— 4) 36 лѣтъ. Искусственный выкидышъ на 4-мъ мѣсяцѣ 4-й беременности по причинѣ неукротимой рвоты. Лихорадка, боли въ ногахъ, полупараличъ, атрофія, отсутствіе колѣнныхъ рефлексовъ. Улучшеніе подѣ влияніемъ массажа и теплыхъ ваннъ. Авторъ полагаетъ, что полинейритъ беременныхъ и родильницъ есть инфекціонная болѣзнь *sui generis*; при послѣдующихъ беременностяхъ она обыкновенно не повторяется. *Н. Какушкинъ.*

145. **И. М. Влохъ.**—Случай *uterus didelphys et vaginasepta completa*.—Проток. И. Виленск. Мед. Общ. 12 сентября 1896 года. Стр. 139).

Больная 28 л., изъ здоровой семьи, жалуется на безплодіе. Мѣсячныя съ 14 лѣтъ, продолжаются по 5—6 дней каждыя 4 недѣли. Замужемъ 8 лѣтъ; 2 года назадъ, повидимому, имѣла выкидышъ. Дѣвственная плева съ двумя отверстіями: правое пропускаетъ одинъ указательный палецъ, лѣвое—два. Влагалище двойное, перегородка мясистая, въ $\frac{1}{4}$ сан. толщиной. Правое влагалище менѣе объемисто, чѣмъ лѣвое. Въ сводахъ каждаго развитыя шейки съ овальными отверстіями. На уровнѣ внутренняго зѣва тѣла матокъ расходятся, и соединеніе между ними не опредѣляется. Придатки прощупываются нормальными. Длина полости лѣвой матки $7\frac{1}{2}$ сант., правой $6\frac{1}{2}$ сант. и менструируютъ обѣ матки одновременно, крови теряютъ не одинаковое количество. Для изытія безплодія авторъ предлагаетъ въ описанномъ случаѣ удалить влагалищную перегородку. *Н. Какушкинъ.*

146. **С. П. Шахъ-Пароніанцъ.**—Объ оперативномъ лѣченіи выпаданій матки.—(Медиц. Сборникъ И. Кавказск. Медицин. Общества № 59. Тифлисъ 1896, стр. 89).

Разобравъ всѣ предложенныя для этого способы, авторъ высказывается за способы *Freund'a* и *Lefors-Heigelbauera* при выпаденіяхъ у старыхъ женщинъ и за промежностно-влагалищныя пластическія операціи *Hegar'a*—у молодыхъ. Онъ исключаетъ операцію укороченія круглыхъ связокъ и допускаетъ брюшностѣночное укрѣпленіе матки какъ операцію, совершаемую попутно; для влагалищнаго удаленія матки онъ оставляетъ случаи невравимыхъ выпаденій и случай выпаденій матки, пораженной