

въ задній сводъ влагалища не найдено. Полость тщательно вычищена и дренажирована: трубкой чрезъ маточное отверстие и полосками обезпложенной марли черезъ нижній уголъ брюшной раны. Послѣ операціи только въ день операціи была  $t^{\circ}$  38,6. Въ остальное время нормальная. На 3-й день марля замѣнена трубкой, на 4-й день трубка изъ матки удалена. Полость плодовместилища и заматочная полость промывались и держались подъ дренажомъ. Первая закрылась на 26-й день, вторая на 13-й день. На 28-й день больная выписалась здовой.

*Н. Какушкинъ.*

**150. Э. Т. Канъ.**—Терапевтическое примѣненіе пара при эндометритахъ послѣродового періода.—(Проток. И. Виленск. Мед. Общ. 12 сентября 1896 г., стр. 155).

Авторъ измѣнилъ немного аппаратъ проф. В. О. Снегирева, придѣлавъ къ нему кранъ и увеличивъ объемъ котла. Температура пара съ  $100^{\circ}$ , при 2-минутномъ приложеніи, поднималась у автора до  $115^{\circ}$  С. при  $\frac{1}{2}$ —1 минутномъ дѣйствіи. Паръ вызываетъ сильныя сокращенія матки, что обусловливаетъ у нѣкоторыхъ скоропреходящія боли. Обратное развитіе обыкновенно идетъ быстрѣе подъ вліяніемъ пара. Если въ маткѣ имѣются остатки оболочекъ или послѣда, послѣдніе предъ примѣненіемъ пара должны быть удаляемы. Спустя 2—3 дня послѣ приложенія пара полость матки промывается. Чѣмъ тоньше и вялѣе стѣнки послѣродовой матки, тѣмъ ниже должна быть температура пара. При начинающихся воспалительныхъ явленіяхъ въ тазовой брюшинѣ, безъ образованія гноя, паръ дѣйствуетъ благоприятно. Авторъ описываетъ девять случаевъ. Самые лучшіе результаты дали случаи, гдѣ не слишкомъ долго выжидали съ примѣненіемъ пара, впрочемъ и тамъ, гдѣ паръ примѣнялся послѣ испытанія другихъ средствъ онъ выказывалъ свои большія преимущества и велъ къ излѣченію, за исключеніемъ двухъ случаевъ, въ которыхъ послѣродовое зараженіе сдѣлалось общимъ. *Н. Какушкинъ.*

**151. А. Н. Соловьевъ.**—Къ ученію объ удаленіи опухолей придатковъ матки чрезъ влагалище.—(Хирургія 1897 № 2, с. 123).

Авторъ приводитъ краткую исторію этой операціи на основаніи указаній русской литературы и описываетъ собственный случай, въ которомъ онъ у 29-лѣтней больной, страдавшей бѣлками, болями, разстройствами со стороны кишечника и общимъ