

При приложеніи послѣдняго онъ ставилъ одинъ электродъ на лонное сочлененіе, а другимъ возилъ по зудящимъ мѣстамъ.

Н. Какушкинъ.

154. **К. Я. Калиновскій.**—*Haematocoele retrouterinum intra-peritoneale post graviditatem tubariam* и ея лѣченіе.—(Еже-недѣльникъ 1896 г. № 46, с. 633).

Въ статьѣ описывается случай внезапнаго внутренняго кровоте-ченія послѣ трехмѣсячной задержки кровей, гдѣ авторъ огра-ничился назначеніемъ внутрь возбуждающихъ, а на низъ живота холода. Черезъ 4 мѣсяца авторъ опредѣлилъ у больной зама-точную кровяную опухоль, которую сначала лѣчилъ различными расасывающими средствами, а затѣмъ помощью троакара (было извлечено около 300 куб. сант., кровяной жидкости). Послѣдній пріемъ далъ толчокъ къ быстрому расасыванію остатковъ крово-изліянія.

Н. Какушкинъ.

155. **Д. Д. Поповъ.**—Рѣдкій случай приобрѣтеннаго зарощенія влагалища.—Больничная Газ. Боткина, 1897 №№ 11 и 12).

Больная 45 лѣтъ. Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ у нея было лихорадочное состояніе, боли внизу живота, задержка мочи; зло-вонныя выдѣленія изъ влагалища, при чемъ изъ влагалища вы-дѣлилась какая то дряблая опухоль, съ кулакъ величиной. Въ настоящее время у нея рубцовое зарощеніе влагалища въ верх-ней трети ея рубцовыми остатками воспалительнаго процесса окружающей клѣтчатки и съ вѣроятнымъ частичнымъ зарощеніемъ просвѣта маточной шейки. Авторъ думаетъ что все это явилось результатомъ омертвѣнія тканей при гнилостномъ распадѣ и вы-дѣленіи фиброзной опухоли. Онъ не находитъ здѣсь показаній къ оперативному вмѣшательству.

Н. Какушкинъ.

156. **Проф. А. В. Пель.**—*Oroovarium-Poehl.*—(Жур. Медич. Химія и Фармаціи. Декабрь 1896 г., стр. 769).

Авторъ нашелъ въ ячникахъ обильное содержаніе спермина. Опыта *Curatolo-Tarulli* и *Knauer*'а показали, что ячники выдѣ-ляютъ продукты, имѣющее важное значеніе для всего организма. При лѣченіи климактерическихъ разстройствъ ячниковое веще-ство даетъ въ рукахъ многихъ клиницистовъ хорошіе результаты. Это побудило автора извлечь изъ ячника, по возможности, дѣй-ствующее начало. Ближайшею цѣлью при этомъ было, выдѣляя всю совокупность лейкомаиновъ ячника, устранить осаждаемые