

нѣтъ лихорадки, при задержаніи оболочекъ, дѣйствуетъ выжидательно. При появленіи лихорадки извлекаетъ оболочки: по опорожненію мочевого пузыря и прямой кишки смѣщаетъ книзу матку, тщательно обеззараживаетъ влагалище и вводятъ палецъ въ матку, которымъ, отдѣливъ остатокъ оболочекъ, стараются сдвинуть послѣднія къ выходу; затѣмъ полость матки промываютъ. Самымъ удобнымъ временемъ для извлеченія оболочекъ авторъ считаетъ седьмой день послѣ родовъ. Если задержались маленькіе куски оболочекъ и если нѣтъ на лицо ни мѣстныхъ ни общихъ разстройствъ, авторъ оставляетъ ихъ неизвлеченными.

Н. Какушкинъ.

158. Проф. Л. Landau.—**Къ лѣченію яичниковымъ веществомъ болѣзненныхъ явленій естественнаго и преждевременнаго прекращенія мѣсячныхъ.**—(Журн. Медиц. Химіи и Фармаціи декабрь 1896. Стр. 747).

Въ климактерическомъ періодѣ или послѣ удаленія яичниковъ у молодыхъ женщинъ развиваются различныя разстройства со стороны нервной и сосудистой системъ, иногда и въ душевной области, которыя доставляютъ женщинамъ массу страданій. Въ клиникѣ автора для лѣченія этихъ разстройствъ примѣняется яичниковое вещество коровъ и свиней, которое давалось сначала въ облаткахъ, а теперь въ особо-приготовленныхъ таблеткахъ. Тщательно вырѣзанные яичники сушатся въ теченіе 12 часовъ при температурѣ 60°—70°. Къ нимъ для приготовления таблетокъ прибавляется какое нибудь индифферентное *constituens*. Въ каждую таблетку входитъ 0,5 сухого вещества яичника. Результаты лѣченія благоприятны: средство оказалось способнымъ безъ побочнаго дѣйствія облегчать страданія и даже излѣчивать ихъ.

Н. Какушкинъ.

159. С. П. Ѳедоровъ.—**Внѣсумочный способъ полного иссѣченія матки путемъ чревосѣченія.**—(Хирургія. 1897 г. № 2, стр. 134).

У 42 лѣтней больной, имѣвшей фиброміому матки (умѣренно подвижна; верхняя граница на 1 смтм. выше пупка) и кистому яичника, сдѣлано чревосѣченіе. Киста освобождена отъ срощеній въ дугласѣ и вмѣстѣ съ маткой выведена изъ таза, отсоеенъ и отсѣченъ отъ матки задній сводъ и передній. Черезъ образованныя такимъ образомъ отверстія введенъ (со стороны влагалища) зажимной пинцетъ, которымъ зажата часть широкой