

связки съ одной стороны. По разсѣчені послѣдней зажата другимъ зажимомъ остальная часть той-же связки и также разсѣчена. Затѣмъ тоже сдѣлано и съ другой широкой связкой. По удаленію матки тазовая рана затампонирована полосой марли, конецъ который выведенъ во влагалище; по срединѣ задній лоскутъ брюшины пристегнуть къ переднему лоскуту: зажимы удалены черезъ 48 часовъ, полоса марли на 8-й день. Больная поправилась.

*Н. Какушкинъ.*

160. В. Вобровъ.—Къ вопросу о вѣматочной беременности.—(Хирургія. 1897. № I. стр. 64).

Больная 28 лѣтъ, рожавшая. Послѣ трехмѣсячной задержки кровей, при признакахъ беременности, появилось кровотечение и боли внизу живота. Кровотечение продолжалось три дня, боли не прекращались болѣе мѣсяца, когда послѣ обычнаго гинекологическаго изслѣдованія нѣсколькими врачами, у больной развились явленія внутреннего кровотечения. Чревосѣченіе произведено черезъ 4—5 часовъ послѣ этого и показало лопнувшую беременную правую трубу съ сидящимъ тамъ послѣдомъ, свободно лежащій въ дугласѣ 4—5 мѣсячный мертвый плодъ женскаго пола и обильное свободное кровоизліяніе въ брюшную полость. Показанія къ операціи были жизненныя. Беременная труба и яичникъ этой же стороны удалены, брюшная полость освобождена отъ крови, промыта растворомъ поваренной соли; въ нее передъ зашиваніемъ брюшной стѣнки влито около 4 стакановъ раствора соли. Дугласъ дренированъ полоской марли, выведенной въ нижній уголъ брюшной раны. Больная поправилась.

*Н. Какушкинъ.*

161. Н. А. Гальбрейхъ.—Случай *fistulae vagino (sulvo)perineo—rectalis post coitum*.—(Врачебн. Записки—1897. № № 2 и 3).

Больная 35 лѣтъ отъ роду, замужемъ 1 г. 10 мѣс. При первомъ половомъ сношеніи penis разорвалъ промежность, не нарушивъ цѣлости дѣвственной плевы, и, расщепивъ влагалищно-кишечную стѣнку, проникъ въ полость прямой кишки. Впослѣдствіи сношенія совершались черезъ каналъ, образовавшійся такимъ образомъ. Получилось отсутствіе полового удовлетворенія при сношеніяхъ, бесплодіе и недержаніе газовъ и кала. Каналъ былъ уничтоженъ наложеніемъ швовъ на собственно кишечную рану и пришиваніемъ отщепленной стѣнки влагалища къ промежности.

Для послѣдней цѣли былъ разсѣченъ hymen и задняя стѣнка влагалища, соответственно окровавлены края промежностнаго свища. Результаты операціи получились хорошіе: во влагалище получился свободный входъ и цѣлость промежности была восстановлена.

*Н. Какушкинъ.*

162. А. А. Ануфріевъ.—О колебаніи величины *conjugatae diagonalis* въ тазу роженицъ и родильницъ при различномъ наклоненіи таза и туловища.—(Врачебныя Записки. 1897 г. № № 2 и 3).

Давно уже извѣстно, что, благодаря увеличивающейся во время беременности податливости тазовыхъ сочлененій, размѣры таза у женщинъ беременных и роженицъ способны увеличиваться. Эти увеличенія размѣровъ таза могутъ быть вызваны, какъ показалъ впервые *Walcher*, особымъ положеніемъ туловища и нижнихъ конечностей. Авторъ устроилъ особое приспособленіе для наблюденій надъ родами въ *Walcher*'овскомъ положеніи (рис. смотри въ курсѣ Акушерства *Н. В. Ястребова*). Пользуясь антропологической формулой *Stied*'ы, авторъ вычислилъ, что при опусканіи у роженицъ ногъ и головного конца туловища діагональная конъюгата увеличивается до одного смт., иногда больше. Наоборотъ, размѣры выхода таза, какъ поперечный такъ и прямой увеличиваются при положеніи туловища съ пригнутыми ногами. Кромѣ того, авторъ подмѣтилъ, что маточныя сокращенія усиливаются при измѣненіи осей матки по направленію тазоваго входа.

*Н. Какушкинъ.*

163. М. Лутохинъ.—Случай пузырнаго заноса при двойняхъ.—(Врачебныя Записки. 1897. № № 2 и 3).

Многородящая 38 лѣтъ. На 7-мъ мѣсяцѣ беременности появилось кровотеченіе изъ матки. Роды произошли на 8-мъ мѣсяцѣ: родился живой мальчикъ вѣс. 1950 грм. (ягодичное предлежаніе). Вслѣдъ за плодомъ выдѣлилась масса пузырнаго заноса (вѣс. 400 грм.), въ которомъ съ помощью лупы можно было открыть остатокъ плода и амніона. Кровотеченіе прекратилось и родильница скоро поправилась. Разсуждая объ этиологіи даннаго случая, авторъ присоединяется къ мнѣнію *Kehrer*'а, который пузырный заносъ относитъ къ разряду *monstra aberrantia*. Онъ обращаетъ вниманіе на пузырный заносъ, какъ на неупоминаемую нигдѣ причину кровотеченія изъ матки при несомнѣнномъ нахожденіи въ послѣдней живого плода.

*Н. Какушкинъ.*