

Для послѣдней цѣли былъ разсѣченъ *humer* и задняя стѣнка влагалища, соотвѣтственно окровавлены края промежностнаго свища. Результаты операціи получились хорошіе: во влагалище получился свободный входъ и цѣлость промежности была восстановлена.

*Н. Какушкинъ.*

162. А. А. Ануфріевъ.—О колебаніи величины *conjugatae diagonalis* въ тазу рожениць и родильницъ при различномъ наклоненіи таза и туловища.—(Врачебныя Записки. 1897 г. № № 2 и 3).

Давно уже извѣстно, что, благодаря увеличивающейся во время беременности податливости тазовыхъ сочлененій, размѣры таза у женщинъ беременныхъ и рожениць способны увеличиваться. Эти увеличенія размѣровъ таза могутъ быть вызваны, какъ показалъ впервые *Walcher*, особымъ положеніемъ туловища и нижнихъ конечностей. Авторъ устроилъ особое приспособленіе для наблюденій надъ родами въ *Walcher*'овскомъ положеніи (рис. смотри въ курсѣ Акушерства *Н. В. Ястребова*). Пользуясь антропологической формулой *Stied*'ы, авторъ вычислилъ, что при опусканіи у рожениць ногъ и головного конца туловища діагональная конъюгата увеличивается до одного снтм., иногда больше. Наоборотъ, размѣры выхода таза, какъ поперечный такъ и прямой увеличиваются при положеніи туловища съ пригнутыми ногами. Кромѣ того, авторъ подмѣтилъ, что маточныя сокращенія усиливаются при измѣненіи осей матки по направленію тазоваго входа.

*Н. Какушкинъ.*

163. М. Лутохинъ.—Случай пузырьнаго заноса при двойняхъ.—(Врачебныя Записки. 1897. № № 2 и 3).

Многородящая 38 лѣтъ. На 7-мъ мѣсяцѣ беременности появилось кровотеченіе изъ матки. Роды произошли на 8-мъ мѣсяцѣ: родился живой мальчикъ вѣс. 1950 грм. (ягодичное предлежаніе). Вслѣдъ за плодомъ выдѣлилась масса пузырьнаго заноса (вѣс. 400 грм.), въ которомъ съ помощью лупы можно было открыть остатокъ плода и амніона. Кровотеченіе прекратилось и родильница скоро поправилась. Разсуждая объ этиологіи даннаго случая, авторъ присоединяется къ мнѣнію *Kehrer*'а, который пузырьный заносъ относитъ къ разряду *monstra aberrantia*. Онъ обращаетъ вниманіе на пузырьный заносъ, какъ на неупоминаемую нигдѣ причину кровотеченія изъ матки при несомнѣнномъ нахожденіи въ послѣдней живого плода.

*Н. Какушкинъ.*