

164. **К. Иноевъ.**—Медицинскій отчетъ родильнаго пріюта Голицинской больницы въ Москвѣ за 1895 годъ.—(Медиц. отч. Московской Голицинской больницы за 1895 годъ. Москва. 1896. Стр. 1).

Поступило въ пріютъ 1067 (въ томъ числѣ 54 беременных). Разрѣшилось 1037. Срочныхъ родовъ было 932. Двойней 11. Родилось дѣтей 1024 (въ томъ числѣ 535 мальчиковъ). Замужнихъ роженицъ было 69,6% (больше чѣмъ въ прошломъ году). Преобладающими по сословію были крестьянки и мѣщанки, всего менѣе было купчихъ и лицъ духовнаго званія. Первороженицы составили 3% всего числа роженицъ. Узкихъ тазовъ было 14. Изъ большихъ операціи поворотъ сдѣланъ 8 разъ (0,8%), щипцы наложены 18 разъ (1,7%), краніотомія сдѣлана 9 разъ (въ томъ числѣ 2 раза на живомъ плодѣ). Здоровыхъ родильницъ (t^0 не выше 38^0) было 84%. Болѣвшихъ послѣродовыми формами было 1,2%. Умерло отъ послѣродовыхъ формъ 0,3%.

Н. Какушкинъ.

165. **Н. С. Киселевъ.**—Вліяніе раннихъ браковъ на женщинъ и рождаемыхъ ими дѣтей.—(Вѣстн. Общ. Гиг., Суд. Практ. Медицины, 1897, февраль).

Исслѣдованія *Chunder'a* и *Joubert'a* показали, что ранніе браки вліяютъ неблагопріятно на здоровье женщинъ, напр. плодовитость и на здоровье рождаемыхъ ими дѣтей. Авторъ провѣрилъ эти результаты по отношенію къ жителямъ Кавказа на основаніи карточныхъ свѣдѣній, доставленныхъ мѣстными врачами. Всего онъ разсмотрѣлъ свѣдѣнія о 2395 женщинахъ. Средній возрастъ первыхъ мѣсячныхъ оказался у автора для жителей Кавказа 14,25 лѣтъ. Самымъ раннимъ годомъ наступленія мѣсячныхъ было 9 лѣтъ. Вышло замужъ до 13 лѣтнаго возраста 201 женщина. До наступленія мѣсячныхъ вышло замужъ 672 женщины. Изъ нихъ нерожавшихъ было 6,9%: а среди вышедшихъ замужъ „зрѣлыми“, т. е. послѣ наступленія мѣсячныхъ, нерожавшихъ было 9,6%. Слѣдовательно, ранніе браки дали меньшее число нерожавшихъ, т. е. оказались болѣе плодовитыми (авторъ утверждаетъ, однако противное, не смотря на всю очевидность выведенныхъ имъ же цифръ. *Рез.*). Женщины, вышедшія замужъ зрѣлыми скорѣе послѣ брака начинаютъ родить и промежутки времени между родами у нихъ меньше, что у женщинъ, вышедшихъ замужъ незрѣлыми. Наибольшее число дѣтей на одну мать приходится у женщинъ, вышедшихъ замужъ 8 лѣтъ отъ роду,

затѣмъ у вышедшихъ 18 лѣтъ, 7 лѣтъ, 9 лѣтъ, 10 лѣтъ, 11 лѣтъ, 17 лѣтъ, наконецъ 14 лѣтъ, 16 лѣтъ, 12 лѣтъ и 15 лѣтъ. (У автора эта постепенность не отмѣчена, хотя очевидна изъ составленной имъ же таблицы. Онъ почему то хочетъ такъ, чтобы наибольшей плодовитостью отличались женщины, вышедшія замужъ 17 лѣтъ. Замѣчательно, что та же таблица, въ противуположность стремленіямъ автора, показываетъ большую плодовитость женщинъ, вышедшихъ замужъ до наступленія мѣсячныхъ. *Ресф.*) Въ послѣдующей за бракомъ жизни женщины, вышедшія замужъ рано, чаще страдаютъ разными болѣзнями: вполне здоровыхъ между ними оказалось 65,2⁰/о; въ то время какъ среди женщинъ, вышедшихъ замужъ зрѣлыми, вполне здоровыхъ было 79,2⁰/о. Это не мѣшаетъ раннимъ бракамъ давать болѣе жизнеспособныхъ и болѣе здоровыхъ дѣтей, что неотказывается подтвердить и самъ авторъ.

Н. Какушкинъ.

166. В. Михайловъ.—Средніе русскіе акушерскіе итоги за пятьдесятъ лѣтъ.—(С.-Петербургская диссертация. Новгородъ 1895 г.).

Работа составлена на основаніи печатныхъ отчетовъ русскихъ родовспомогательныхъ учрежденій за 1840—1890 гг. Наибольшій матеріалъ дали столичные учрежденія (60 печатныхъ источниковъ), на долю провинціи приходится только 20 печатныхъ отчетовъ. Авторъ между прочимъ дѣлаетъ бѣглый и сторонній очеркъ роста русскихъ родильныхъ домовъ. Всего за пятьдесятъ лѣтъ собрано имъ 257988 родовъ. Онъ выводитъ заключеніе, что при наличномъ числѣ кроватей въ родильныхъ домахъ пустующихъ мѣстъ не бываетъ, и не всѣ нуждающіяся въ акушерской помощи находятъ ее здѣсь. Незамужніе роженицы составили 65⁰/о общаго числа. Повторнороженіцы—69,1⁰/о. Съ большими подробностями авторъ останавливается на положеніяхъ плода. По мнѣнію автора многоплодные роды (2,07⁰/о) въ Россіи встрѣчаются чаще, чѣмъ за границей. Процентъ родовъ раньше срока равенъ 10,18⁰/о. Осложненія родовъ авторъ дѣлитъ на три группы: на осложненіе со стороны матери, со стороны плода и со стороны промежуточныхъ между плодомъ и матерью органовъ. Эклампсія наблюдалась однажды на 147 родовъ. Узкіе тазы—въ отношеніи 1:23. Много мѣста авторомъ удѣлено оперативнымъ пособіямъ при родахъ. Между прочимъ, щипцы были наложены въ 2,47⁰/о родовъ, поворотъ примѣнялся въ 1,46⁰/о родовъ. Кесарское сѣченіе сдѣлано всего 42 раза. Пробоженіе головки плода 908 разъ (0,38⁰/о).