

литературѣ не имѣется. Авторъ изслѣдовалъ микроскопически фаллопьевы трубы 102 женщинъ. Изъ послѣднихъ 67 были дѣвочки и взрослые, умершія главнымъ образомъ отъ разныхъ общихъ заразныхъ болѣзней; 15 были страдавшія разными воспалительными процессами въ трубахъ, 16 имѣвшія трубную беременность; 4—съ фиброміомой матки. Изслѣдованія привели автора къ заключенію, что въ здоровыхъ трубахъ эластическая ткань развивается постепенно, по мѣрѣ роста организма: до конца перваго года внѣ утробной жизни ткань эта имѣется въ неразвитомъ состояніи, лишь въ брюшной и подбрюшинной клѣтчаткѣ; у 12—13 лѣтнихъ дѣвочекъ эластическая ткань относительно хорошо развита, при чемъ присутствіе ея замѣчается до подслизистаго слоя включительно, степень развитія ея тѣмъ слабѣе чѣмъ ближе она къ внутреннему слою стѣнки трубы, у женщинъ 21—42 лѣтъ эластическая ткань вполнѣ развита, волокна ея доходятъ до эпителия; у 45—50 лѣтъ эластическая ткань подвергается обратному, старческому развитію, число волоконъ уменьшается по направленію къ наружному мышечному слою. Въ трубныхъ мѣшкахъ замѣчается особенно сильное развитіе эластической ткани въ мышечномъ слоѣ. При трубной беременности, наоборотъ, эластическая ткань развита очень слабо, или даже совсѣмъ исчезаетъ.

*Н. Какушкинъ*

169. А. Эберлинъ.—Отчетъ о больныхъ съ женскими болѣзнями за 1895 г. Московской Голицынской больницы.—(Медиц. отч. Московской Голицынской больницы за 1895 годъ. Москва, 1896, стр. 79).

Съ болѣзнями наружныхъ половыхъ органовъ, влагалища, мочеиспускательнаго канала и пузыря было 9. Съ эндометритами 62, со свищами 3, съ хроническимъ воспаленіемъ матки 8, съ воспаленіями клѣтчатки, брюшины и придатковъ 43. Ракъ матки встрѣтился 37 разъ (изъ нихъ 27 случаевъ запущенныхъ); коренное лѣченіе примѣнено 9 разъ съ 1 смертнымъ исходомъ (раненіе пузыря). Саркома матки наблюдалась 3 раза (запущенные случаи); фибромы 8 разъ, въ послѣднихъ случаяхъ примѣнялись эрготинъ, выскабливаніе (2 раза); надвлагалищное отсѣченіе матки (1 разъ). Смѣщенія матки и влагалища и измѣненія просвѣта ихъ наблюдались 28 разъ. Больныхъ беременныхъ и родильницъ было 9 человекъ. Всего больныхъ было 230. Умерло 9,13%. Операций сдѣлано 110 съ 1 смертельнымъ исходомъ.

*Н. Какушкинъ.*