

ствіе ртути объясняется дезинфекціей крови и соковъ ткани, что дѣлаеть почву негодною для развитія бактерій.

Примѣняя съ хорошими результатами втираніе сѣброй ртутной мази при острыхъ флегмонахъ, авторъ сталъ примѣнять это леченіе и при послѣродовыхъ заболѣваніяхъ. Подъ его изслѣдніемъ были слѣдующіе случаи: 2 метрофлебита (піэмія), острая септицемія, peritonitis; 4 послѣродовые пери-параметрита и 1 перипараметритъ не послѣродового происхожденія. Сеансъ втиранія продолжался около часу (15,0), черезъ часъ втиралась вторично такая же порція, мѣсто, гдѣ втерта мазь, покрывалась ватой, поверхъ которыхъ накладывалась клеенка, а затѣмъ фланель, чѣмъ предотвращалось вдыханіе паровъ ртути. Больную переносили въ другую комнату, а первую вентилировали. Полосканіе рта бертолетовой солью, усиленное питаніе.

Выводъ изъ наблюденій; черезъ 10—12 часовъ послѣ втиранія 30,0 ртутной мази t^0 понижалась до нормы на 2—5 дней.

При экссудатахъ достаточно было 2 втиранія, при піэміи 3—4, чтобы совершенно прекратилась лихорадка.

Экссудаты быстро всасывались, чему могъ способствовать и самый актъ втиранія, т. е. массажъ.

Послѣдовательныхъ сращеній матки съ сосѣдними органами не было; отравленія ртутью не было; нагноеній, метастазовъ, смерти не было.

Изъ существующихъ въ настоящее время трехъ методовъ леченія-выжидательнаго, сывороточнаго и меркуріальнаго авторъ отдаеть предпочтеніе послѣднему.

174. Э. М. Собѣстіанскій.—Семь чревосѣченій и два случая удаленія фиброміомъ черезъ влагалище.—(Протоколь засѣданія Императорскаго Кавказскаго Медицинскаго Общества, 1897, № 18).

3 случая касались яичниковыхъ кистъ, 3 маточныхъ фиброміомъ, 1 янпаротомія пробная по поводу фибромы брыжжейки; изъ двухъ фиброміомъ, удаленныхъ чрезъ влагалище, въ одномъ случаѣ фиброміома матки была гангренофицированная.

175. Л. Н. Варнекъ.—Два случая операціи Doyen-Landau съ неблагопріятнымъ исходомъ.—(Врачебныя записки, 1897, № 8 и 9).

1 случай—salpingoophoritis chronica, perisalpyngitis adhaesiva Въ виду полной безуспѣшности противовоспалительнаго лѣченія и настоятельныхъ просьбъ больной, черезъ влагалище удалены