

ствие ртути объясняется дезинфекцией крови и соковъ ткани, что дѣлаетъ почву негодною для развитія бактерій.

Примѣняя съ хорошими результатами втираніе сѣрой ртутной мази при острыхъ флегмонахъ, авторъ сталъ примѣнять это леченіе и при послѣродовыхъ заболѣваніяхъ. Подъ его наблюденіемъ были слѣдующіе случаи: 2 метрофлебита (піэмія), острая септицемія, peritonitis; 4 послѣродовые пери-параметрита и 1 перипараметритъ не послѣродового происхожденія. Сеансъ втиранія продолжался около часу (15,0), черезъ часъ втиралась вторично такая же порція, мѣсто, гдѣ втерта мазь, покрывалась ватой, поверхъ которыхъ накладывалась клеенка, а затѣмъ фланель, чѣмъ предотвращалось вдыханіе паровъ ртути. Больную переносили въ другую комнату, а первую вентилировали. Полосканіе рта бертолетовой солью, усиленное питаніе.

Выводъ изъ наблюденій; черезъ 10—12 часовъ послѣ втиранія 30,0 ртутной мази t^0 понижалась до нормы на 2—5 дней.

При экссудатахъ достаточно было 2 втиранія, при піэміи 3—4, чтобы совершенно прекратилась лихорадка.

Экссудаты быстро всасывались, чему могъ способствовать и самый актъ втиранія, т. е. массажъ.

Послѣдовательныхъ сращеній матки съ сосѣдними органами не было; отравленія ртутью не было; нагноеній, метастазовъ, смерти не было.

Изъ существующихъ въ настоящее время трехъ методовъ леченія-выжидательнаго, сывороточнаго и меркуріальнаго авторъ отдастъ предпочтеніе послѣднему.

174. Э. М. Собѣстіанскій.—Семь чревосѣченій и два случая удаленія фиброміомъ черезъ влагалище.—(Протоколъ засѣданія Императорскаго Кавказскаго Медицинскаго Общества, 1897, № 18).

3 случая касались яичниковыхъ кистъ, 3 маточныхъ фиброміомъ, 1 япартотомія пробная по поводу фибромы брыжжейки; изъ двухъ фиброміомъ, удаленныхъ чрезъ влагалище, въ одномъ случаѣ фиброміома матки была гангренофицированная.

175. Л. Н. Варнекъ.—Два случая операціи Doyen-Landau съ неблагопріятнымъ исходомъ.—(Врачебныя записки, 1897, № 8 и 9).

1 случай—salpyngoophoritis chronica, perisalpyngitis adhaesiva Въ виду полной безуспѣшности противовоспалительнаго лѣченія и настоятельныхъ просьбъ больной, черезъ влагалище удалены

матка и трубы; яичники были оставлены, въ виду невозможности удаленія ихъ вслѣдствіе сращеній; на каждую широкую связку наложено по два зажима. На 8 день послѣ операціи внезапно наступило маниакальное состояніе и признаки кишечно-влагалищной фистулы. По совѣту психіатра операція фистулы была отложена и больная переведена въ психіатрическую больницу. Фистула, вѣроятно, произошла отъ пролежня, обусловленнаго давленіемъ концовъ зажима на стѣнку кишки.

2 случай *metritis chronica, salpyngoophoriti chronica bilatellaris, perisalpyngitis et perioophoritis adhaesiva*. Обычное лѣченіе безуспѣшно. Влагалищное удаленіе матки съ придатками помощью зажимовъ. На 6 день операціи—явленія непроходимости кишекъ. Чревосѣченіе кончилось смертію черезъ сутки.

Авторомъ произведено 41 влагалищныхъ удаленій матки съ придатками лигатурнымъ способомъ и 44 операціи способомъ на зажимахъ; въ каждой изъ этихъ двухъ серій было по 2 смертельныхъ исхода. Сравнивая оба эти метода, авторъ рѣшительно высказывается за зажимы, а не за лигатуры.

176. В. О. Саваневскій.—Случай искусственныхъ преждевременныхъ родовъ при обще-сѣуженномъ тазѣ.—(Медицинское Обозрѣніе, 1897, Апрель).

8-мѣсячная беременность. Позвоночникъ въ грудной части—представляетъ кифозъ, въ поясничной части—сколиозъ; *venter propendens*; обще-неравномѣрно-сѣуженный тазъ; с. в. 8 см. кашель, объективные признаки легочнаго заболѣванія; бѣлокъ въ мочѣ. Въ виду общаго состоянія больной и сѣуженнаго таза пришлось прибѣгнуть къ искусственнымъ преждевременнымъ родамъ. Назначены восходящія души *Кивина*, которые дѣлались каждые 3 часа, и t^0 ихъ достигала до 38^0 . Черезъ 11 часовъ родился ребенокъ. Больная выписалась изъ больницы съ явленіями верхушечнаго процесса въ легкихъ.

Спустя 2 недѣли она поступила вновь въ больницу, гдѣ и умерла чрезъ 11 дней отъ хроническаго паренхиматознаго нефрита.

Приведенный случай краснорѣчиво говоритъ за методъ *Kiwisch'a* какъ средство, вызывающее не только раскрытіе маточной шейки, но и какъ могущественное средство для вызыванія маточныхъ сокращеній. Онъ въ описанномъ случаѣ вызвалъ быстрые и сравнительно легкіе роды. Способъ этотъ вполне безвредный, онъ не связанъ съ тѣми опасностями, которыя сопровождаютъ