

описываетъ произведенную имъ операцію рукавного укрѣпленія ретрофлексированной и опущенной матки, по способу *Duhrssen'a* и *Mackenrodt'a*, съ видоизмѣненіемъ *Wendeler'a*, предложившаго пришивать матку на 2 см. ниже дна ея. P.

179. И. М. Львовъ.—Кесарское сѣченіе при безъ условномъ суженіи таза, съ благоприятнымъ исходомъ для матери и плода.—(Врачъ, 1897, № 2).

Размѣры таза: D. tr. 27, D. cr. 26, D. sp. 23, Conjugata ext. 13 съ небольшимъ, Conj. diag. около 7,5; мысь сильно выдается въ полость малаго таза, хорошо выраженъ также и второй мысь; тазъ непропорціоналенъ,—правая половина меньше лѣвой. Первые роды наступили нѣсколько преждевременно, кончены краниотоміей съ послѣдующей краниоклязіей. При второй беремености опредѣлено косое положеніе плода. Принимая во вниманіе безусловное суженіе таза съ conj. vera около 5, а равно и то, что первые роды недоношеннымъ мертвымъ плодомъ едва были окончены чрезъ естественные пути, съ согласія больной и ея мужа произведено кесарское сѣченіе. Въ разрѣзъ матки попалъ послѣдъ, но кровотеченіе не было сильное. Маточные швы наложены въ 2 этажа: сывороточно—мышечные и сывороточные, по 8. На 24 день больная выписалась, совершенно поправившись и даже поздоровѣвъ, со здоровымъ ребенкомъ. P.

180. Проф. А. И. Лебедевъ.—Перелойное заболѣваніе женскихъ половыхъ частей и его вліяніе на отправленіе этихъ органовъ и общее состояніе больныхъ.—(Врачъ; 1897, № 3).

Статья представляетъ свѣдѣній, имѣющихся въ настоящее время въ литературѣ по затронутому вопросу.

Пути зараженія: coitus, совмѣстное спанье больной женщины со здоровою; употребленіе одной и той-же губки для подмыванія больной и здоровой: вульвовагинитъ новорожденныхъ отъ родовыхъ путей матери.

Влагалище, покрытое многослойнымъ плоскимъ эпителиемъ, менѣе воспримчиво къ перелойной заразѣ, чѣмъ остальные части полового прибора, покрытыя цилиндрическимъ эпителиемъ; по частотѣ зараженія отдѣльныя части полового аппарата идутъ въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ: мочеиспускательный каналъ, маточная шейка, полость матки, влагалище, бартолиневы железы, трубы, наружныя половыя части. Частота заболѣва-