

Костнато сращения не получилось, но концы костей спаялись плотной соединительной тканью, которая со временем дѣлалась, очевидно, все крѣпче и крѣпче, такъ, что шаткая походка, бывшая въ первое время послѣ вставанія, уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ стала совершенно нормальной. Поврежденія мягкихъ частей также не оставили послѣ себя замѣтныхъ слѣдовъ.

Въ статьѣ приведены относящіяся къ вопросу о разрывѣ лоннаго сочлененія во время родовъ литературныя данныя.

Н. Рачинскій.

186. **Г. М. Фужсъ.**—**Къ вопросу о леченіи безплодія.**—(Протоколы и труды общества херсонскихъ врачей, 1895—96 г. Изд. 1897).

Разобравъ причинную связь между безплодіемъ и anteflexio uteri (uterus infantilis?), авторъ предлагаетъ пессарій тоже при безплодіи вслѣдствіе anteflexio, и приводитъ три случая, гдѣ безплодныя больныя съ anteflexio uteri послѣ примѣненія пессарія забеременѣли. Впрочемъ, теоретическія соображенія автора по поводу пригодности пессарія Годже при anteflexio uteri не вполне убѣдительны. Вотъ эти соображенія автора: по мимо того, что пессарій ставитъ *portionem vaginalem uteri* на физиологическое ея мѣсто, онъ, производя постоянное давленіе сзади напередъ въ области внутренняго зѣва, способствуетъ увеличенію передняго угла (?), а тѣмъ самымъ облегчаетъ кровообращеніе во всей маткѣ слѣдовательно, такой хорошо прилаженный пессарій можетъ облегчить и дисменоррею; наконецъ, въ виду, того, что при патологической anteflexio uteri крестцово-маточныя связки укорочены, пессарій Годже, отклоняя *corpus uteri* нѣсколько кпереди, нѣсколько натягиваетъ эти связки, т. е. поддерживаетъ ихъ тонусъ, слѣдовательно, дѣйствуетъ нѣкоторымъ образомъ подобно массажу (?) особенно если принять во вниманіе періодическія наполненія мочевого пузыря и прямой кишки.

187. **С. Д. Тотешъ.**—**Colporrhæxis sub partu.**—(Протоколы и труды общества херсонскихъ врачей, 1895—96, изд. 1897).

Въ больницу поступила роженица съ отошедшими 2 дня назадъ водами. Рожаетъ 9 разъ. Принявшій больную врачъ, излѣдуя ее чрезъ влагалище, замѣтилъ, что весь просвѣтъ послѣдняго занятъ опухолью головы плода; войдя глубже рукою, онъ нащупалъ ясно контуры головки, которая лежала надъ входомъ въ тазъ; на одномъ почти уровнѣ съ головкой, сзади отъ нея распо-