

17. Saver.—Ueber Beckenneigung.—(Arch. f. Gyn., Bd. LI, Hft. 2).—**О наклоненіи таза.**

Исслѣдованія всѣхъ прежнихъ авторовъ относительно наклоненія таза имѣютъ тотъ недостатокъ, что они производились или исключительно на живыхъ или же исключительно на трупахъ, при чемъ обращалось вниманіе или только на наклоненіе *conj. ext.* или же лишь на наклоненіе *conj. verae*. А между тѣмъ желательно имѣть возможность на основаніи доступныхъ наружныхъ измѣненій, а именно *conj. ext.* судить о степени наклоненія *conj. verae*. Для этого необходимо конечно прежде всего найти отношеніе, въ которомъ обѣ эти линіи находятся между собою, а главное опредѣлить, настолько-ли это отношеніе постоянно, что-бы при его помощи безошибочно можно было судить о наклоненіи *conj. verae* на основаніи наклоненія *conj. ext.* Произведенныя авторомъ при помощи особаго инструмента измѣренія показываютъ, что дѣйствительно съ извѣстною долею вѣроятія можно судить о наклоненіи *conj. vera* на основаніи наклоненія *conj. ext.* Необходимо лишь имѣть въ виду форму таза. Такъ въ нормальномъ тазу *conj. vera* образуетъ съ горизонтомъ уголъ на $5\frac{1}{4}^{\circ}$ болѣе чѣмъ *conj. ext.*, въ рахитическомъ плоскомъ тазу наклоненіе обѣихъ этихъ линій почти одинаково, во всѣхъ другихъ тазахъ наоборотъ разница эта гораздо большая.

С. Ю. Хазанъ.

18. Schreiber.—Ein Beitrag zur Statistik der Eklampsie.—(Arch. f. Gyn., Bd. LI, Hft. 2).—**Къ статистикѣ эклампсіи.**

Авторъ продолжаетъ трудъ Шауты и обрабатываетъ случаи эклампсіи наблюдавшіеся во второй Вѣнской клиникѣ за періодъ времени съ 1880 по 1895 г.; на 42607 случаевъ родовъ эклампсіи наблюдалась 137 разъ. Частота ея колебалась въ отдѣльные годы между 1,1 и 5,8 на тысячу родовъ, въ общемъ она равнялась 3,21%, противъ 2,56% прежнихъ лѣтъ. Изъ матерей 109 или 79,5% были *primiparae*. Въ 16,78% эклампсія наступила до родовъ, въ 62,04% во время родовъ, а въ 21,16% послѣ родовъ. Въ 110 случаяхъ изслѣдовали мочу и за исключеніемъ 8 случаевъ въ ней оказался бѣлокъ, который пропалъ уже въ продолженіи 2—3 дней. Опорожненіе матки оказалось благотворнымъ въ смыслѣ прекращенія припадковъ лишь въ 64% и это благотворное вліяніе было тѣмъ полнѣе, чѣмъ менѣе насилія было употреблено при родоразрѣшеніи.

С. Ю. Хазанъ.