

19. U. Werff.—Giebt es ein sympathisches Ganglion im menschlichen Ovarium?—(Arch. f. Gyn., Bd. II Hft 2).—Находится ли въ человеческомъ яичникѣ симпатическій узелъ?

Авторъ не согласенъ съ мнѣніемъ *Winterhalter* (ср. этотъ журналъ за 1896 г. стр. 1227) относительно характера найденныхъ ею образований и утверждаетъ, что существованіе ганглиозныхъ клетокъ въ яичникѣ еще по сію пору не доказано.

С. Ю. Хазанъ.

20. Walther.—Ein Fall von gleichzeitiger Extraund Intrauterin gravidität bei Uterus subseptus.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. XXXIII Hft 3).—Случай одновременной внѣ и внутриматочной беременности при *uterus subseptus* (съ двойнымъ тѣломъ).

У 35 лѣтней многорожавшей, у которой заподозрѣли внѣматочную беременность и въ слѣдствіе этого сдѣлали ляпоротомию, нашли съ лѣвой тубѣ гематомъ величиною въ куриное яйцо и *uterus bicornis* съ продуктомъ беременности въ правой половинѣ. Три дня послѣ удаленія лѣвыхъ придатковъ появилось маточное кровотеченіе, для остановки котораго пришлось искусственно удалить маточное содержимое, а именно изъ правой половины дѣтское мѣсто съ оболочками а изъ лѣвой одну лишь сильно гипертрофированную *dec. vera*. Теченіе послѣродоваго періода было совершенно нормальное. При тщательномъ изслѣдованіи относящихся сюда препаратовъ авторъ не только убѣдился въ томъ, что въ лѣвой тубѣ была настоящая беременность, но и въ томъ, что беременность эта возникла одновременно съ маточною.

С. Ю. Хазанъ.

21. Ahlfeld.—Ueber die ersten Vorgänge bei der physiologischen Lösung der Placenta.—(Zeitschrift f. Geb. und Gyn., Bd. XXXIII, Hft. 3).—О первоначальныхъ явленіяхъ при физиологическомъ отдѣленіи дѣтскаго мѣста.

Въ этой работѣ А. еще разъ выступаетъ противъ *Duncan'a* и *Fehling'a* въ защиту того ученія (*Baudelocque, Schultze*) по которому выворотъ центральной части плаценты и образованіе ретроплацентарнаго крововзвлянія составляютъ первыя явленія нормальнаго отдѣленія дѣтскаго мѣста.

С. Ю. Хазанъ.