

26. Beckmann.—Zur Complication der Gravidität und Geburt mit Collumkrebs.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd., XXXIV, Hft 1).—**Къ осложненію беременности и родовъ ракомъ шейки.**

Передавъ исторію двухъ наблюденныхъ имъ случаевъ рака матки, изъ которыхъ въ одномъ ракъ былъ диагностированъ на седьмой недѣлѣ беременности и съ успѣхомъ было произведено удаленіе матки черезъ влагалище, а въ другомъ роды наступившіе въ нормальный срокъ протекли хотя и медленно, но вполне нормально, авторъ, на основаніи литературныхъ данныхъ, рисуетъ вамъ въ общихъ чертахъ состояніе вопроса о разбираемомъ страданіи какъ осложненіи беременности и родовъ. Беременность при рагѣ наступаетъ сравнительно рѣдко; по всему видно, что новообразование это, вопреки мнѣнію *Cohnstein*'а не благоприятствуетъ зачатію. На дальнѣйшее теченіе беременности ракъ повидимому не оказываетъ никакого вліянія: выкидышъ при немъ встрѣчается не чаще, чѣмъ это обыкновенно имѣетъ мѣсто. Въ первые четыре мѣсяца беременности удаленіе матки черезъ влагалище, особенно легкое въ техническомъ отношеніи, является безспорно самымъ раціональнымъ образомъ дѣйствія. Изъ 17 до сихъ поръ опубликованныхъ случаевъ ни одна больная не умерла отъ операци. Въ послѣдующіе мѣсяцы также слѣдуетъ прибѣгать къ операци, если только есть возможность удалить всю пораженную ткань. Но относительно оперативнаго приѣма тутъ мнѣнія расходятся. *Olshausen* совѣтуетъ произвести искусственной выкидышъ съ послѣдовательнымъ вылученіемъ матки черезъ влагалище; другіе же авторы стоятъ за немедленное удаленіе матки черезъ брюшные покровы по методу *Freund*'а или по комбинированному влагалищно-брюшному способу. До сихъ поръ брюшной способъ далъ на 12 операций 4 смертныхъ случая. Что касается наконецъ срочныхъ родовъ при рагѣ шейки, то въ послѣднее время, благодаря введенію антисептики и улучшенію оперативныхъ приѣмовъ, въ особенности кесарскаго сѣченія, прогнозъ значительно улучшился. Благопріятнѣе всего проходятъ самопроизвольно оканчивающіеся роды, дающіе 14% смертности для матерей и 25% для дѣтей. Уже менѣе благопріятны результаты тамъ, гдѣ необходимо оперативное пособіе, при чемъ однако оказывается, что при родоразрѣшеніи путемъ кесарскаго сѣченія получаютъ лучшіе результаты для дѣтей, чѣмъ при искусственномъ родоразрѣшеніи *per vias naturales*. Такимъ образомъ выборъ между кесарскимъ сѣченіемъ и искусственнымъ родоразрѣшеніемъ *per vias naturales* въ тяжелыхъ случаяхъ не

затруднителенъ, такъ какъ въ интересахъ плода легко разрѣшается въ пользу перваго приѣма. За то уже гораздо труднѣе въ легкихъ случаяхъ выбирать между кесарскимъ сѣченіемъ и выжидательнымъ методомъ.

С. Ю. Хазанъ.

27. Н. W. Freund.—Ueber böartige Tumoren der Chorionzotten.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd XXXIV Hft 2).—О злокачественныхъ опухоляхъ хоріальныхъ ворсинокъ.

Вслѣдствіе сильныхъ кровотеченій Fr. спустя 3 мѣсяца послѣ нормальныхъ родовъ удалилъ плацентарный полипъ, который, не смотря на то, что при анатомическомъ изслѣдованіи оказался совершенно невиннымъ, возбудилъ его подозрѣніе благодаря своему проникновенію глубоко въ мышечную ткань маточной стѣнки. Дѣйствительно, 7 недѣль спустя нужно было у той же больной вылущить узелъ во влагалищѣ, который оказался саркомою deciduo-cellulare, а 4 мѣсяца спустя еще нѣсколько такихъ узловъ и даже всю матку, въ которой развилась злокачественная опухоль, состоявшая исключительно изъ элементовъ syncytium'a. Въ эпикризѣ къ своему случаю авторъ высказывается за мнѣніе Turner'a о материнскомъ не эндотелиальномъ происхожденіи syncytium'a, причемъ выражаетъ предположеніе о роли сифилиса въ этиологіи какъ пузырьнаго заноса такъ и разбираемой злокачественной опухоли.

С. Ю. Хазанъ.

28. Franqué.—Ueber eine böartige Geschwulst des Chorion nebst Bemerkungen zur Anatomie der Blasenmole.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. XXXIV Hft. 2.).—О злокачественной опухоли chorion'a и нѣкоторыя замѣчанія объ анатоміи пузырьнаго заноса.

Четыре недѣли послѣ 6-хъ нормальныхъ родовъ у 32-хъ лѣтней женщины показали крови, которая продолжалась около двухъ мѣсяцевъ и прекратилась лишь послѣ удаленія изъ матки полной горсти плацентарныхъ массъ. Массы эти при изслѣдованіи оказались подозрительными, что и подтвердилось при вторичномъ выскабливаніи произведенномъ мѣсяць спустя для діагностическихъ цѣлей, а также и при непосредственномъ изслѣдованіи вылущенной вслѣдъ за тѣмъ матки. Нашедши въ опухоли элементы какъ syncytium'a такъ и такъ называемаго клетчатого слоя Langhans'a и совершенно соглашаясь съ Marchand'омъ и другими относительно происхожденія разбираемаго злокачественнаго новообразованія отъ chorion'a, авторъ не согласенъ съ этими авторами