

затруднителенъ, такъ какъ въ интересахъ плода легко разрѣшается въ пользу перваго приѣма. За то уже гораздо труднѣе въ легкихъ случаяхъ выбирать между кесарскимъ сѣченіемъ и выжидательнымъ методомъ.

С. Ю. Хазанъ.

27. Н. W. Freund.—Ueber böartige Tumoren der Chorionzotten.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd XXXIV Hft 2).—О злокачественныхъ опухоляхъ хоріальныхъ ворсинокъ.

Вслѣдствіе сильныхъ кровотеченій Fr. спустя 3 мѣсяца послѣ нормальныхъ родовъ удалилъ плацентарный полипъ, который, не смотря на то, что при анатомическомъ изслѣдованіи оказался совершенно невиннымъ, возбудилъ его подозрѣніе благодаря своему проникновенію глубоко въ мышечную ткань маточной стѣнки. Дѣйствительно, 7 недѣль спустя нужно было у той же больной вылущить узелъ во влагалищѣ, который оказался саркомою deciduo-cellulare, а 4 мѣсяца спустя еще нѣсколько такихъ узловъ и даже всю матку, въ которой развилась злокачественная опухоль, состоявшая исключительно изъ элементовъ syncytium'a. Въ эпикризѣ къ своему случаю авторъ высказывается за мнѣніе Turner'a о материнскомъ не эндотелиальномъ происхожденіи syncytium'a, причемъ выражаетъ предположеніе о роли сифилиса въ этиологіи какъ пузырьнаго заноса такъ и разбираемой злокачественной опухоли.

С. Ю. Хазанъ.

28. Franqué.—Ueber eine böartige Geschwulst des Chorion nebst Bemerkungen zur Anatomie der Blasenmole.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. XXXIV Hft. 2.).—О злокачественной опухоли chorion'a и нѣкоторыя замѣчанія объ анатоміи пузырьнаго заноса.

Четыре недѣли послѣ 6-хъ нормальныхъ родовъ у 32-хъ лѣтней женщины показали крови, которая продолжалась около двухъ мѣсяцевъ и прекратилась лишь послѣ удаленія изъ матки полной горсти плацентарныхъ массъ. Массы эти при изслѣдованіи оказались подозрительными, что и подтвердилось при вторичномъ выскабливаніи произведенномъ мѣсяць спустя для діагностическихъ цѣлей, а также и при непосредственномъ изслѣдованіи вылущенной вслѣдъ за тѣмъ матки. Нашедши въ опухоли элементы какъ syncytium'a такъ и такъ называемаго клетчатого слоя Langhans'a и совершенно соглашаясь съ Marchand'омъ и другими относительно происхожденія разбираемаго злокачественнаго новообразованія отъ chorion'a, авторъ не согласенъ съ этими авторами