

лишь относительно происхожденія самыхъ элементовъ chorion'a. По его мнѣнiю syncytium эктодермального, а клѣтчатый слой Langhans'a мезодермального, т. е. оба фетального происхожденія. Второе наблюденіе описываемое авторомъ касается четырехмѣсячнаго пузырьнаго заноса развившагося на почвѣ chorion laeve, въ то время какъ плацента и плодъ развились совершенно нормально. Исходною точкою заболѣванія является по Ег. соединительно-тканевая часть ворсинокъ и въ его случаѣ аномальное выдѣленіе слизи изъ клѣтчатого слоя Langhans'a, между тѣмъ какъ измѣненія syncytium'a представляютъ собою явленіе послѣдовательное и для добракачественнаго заноса во всякомъ случаѣ не характерное.

С. Ю. Хазанъ.

29. Schulz.—Wendung oder hohe Zange.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. XXXIV Hft. 2).—Поворотъ или высокіе щипцы.

Авторъ пришелъ къ тому убѣжденію, что поворотъ на ножки отнюдь не обладаетъ всѣми тѣми преимуществами, которыя приписываютъ ему *Simpson* и другіе. Если оперировать поздно, т. е. долго послѣ отхода водъ, то операція очень трудна, сопряжена съ опасностью преждевременнаго отдѣленія дѣтскаго мѣста, а также разрыва матки вслѣдствіе предшествовавшаго растяженія ея нижняго отрѣзка, и послѣдующее излеченіе, помимо узкости таза затрудняется еще вслѣдствіе неправильнаго членарасположенія плода. Если же оперировать рано, то является опасность излишней полипрагмазии, уже не говоря о томъ, что вслѣдствіи труднаго излеченія шансы для плода и тутъ не хороши. Совершенно иначе обстоитъ дѣло съ высокими щипцами. Пока не угрожаетъ опасности ни матери ни плоду, роды ведутся выжидательнымъ путемъ, когда же является показаніе къ скорѣйшему родоразрѣшенію, можно наложить щипцы, которые дали автору въ одиннадцати случаяхъ весьма удовлетворительные результаты. *Sch.* вообще того мнѣнія, что обвиненія возводимыя многими на высокіе щипцы не выдерживаютъ критики; такъ, то обстоятельство, что головка достигаетъ тазоваго дна въ поперечномъ стояніи, хорошо исправляется или смятіемъ высокихъ щипцовъ и наложеніемъ низкихъ въ косомъ діаметрѣ или просто двумя пальцами введенными въ прямую кишку; въ обоихъ случаяхъ головка продѣлываетъ свой нормальный поворотъ. Замѣчаемая при наложеніи высокихъ щипцовъ поврежденія черепныхъ костей отнюдь не обуславливаются щипцами а лишь узкимъ тазомъ и могутъ

также имѣть мѣсто при поворотѣ и извлеченіи. Точно также не исключительно щипцами обусловливаются сдавленія и поврежденія материнскихъ путей, которыя, т. е. поврежденія во всякомъ случаѣ менѣе опасны, чѣмъ тѣ, которыя бываютъ при поворотѣ. Само наложеніе даже на подвижную головку вовсе не трудно, и наконецъ сложная конструкція отнюдь не мѣшаетъ сдѣлать инструментъ асептическимъ.

*С. Ю. Хазанъ.*

30. G. Leopold.—Zur vaginalen Totalexstirpation des Uterus und der Annexwegen schwerer chronischer Erkrankung derselben.—(Arch. f. G. Bd. 52, III).—Къ полной экстирпаціи матки и придатковъ черезъ рукавъ при тяжеломъ хроническомъ заболѣваніи послѣднихъ.

Вслѣдствіе вышеуказанной причины L. въ теченіе десяти лѣтъ удалилъ матку съ придатками черезъ рукавъ 57 разъ. Приводятся 20 случаевъ, остальные 37 напечатаны раньше въ другомъ мѣстѣ.

Результаты: изъ 57 оперированныхъ умерла 1=1,7%.

Преимущества этой операціи при хроническихъ, тяжелыхъ, гнойныхъ и не гнойныхъ воспаленіяхъ придатковъ, по L. слѣдующія.

1) Полное изъятіе заболѣвшихъ органовъ безъ оставленія воспаленной матки, причиняющей дальнѣйшія страданія.

2) Положеніе раны внизу брюшной полости, само способствующее дренажу.

3) Операціонное поле доступно и у женщинъ не рожавшихъ (рукавно промежностные разрывы).

4) Отсутствіе брюшной раны и избѣжаніе послѣдующихъ грыжъ.

5) Операція далеко не такъ опасна какъ лапаротомія, такъ какъ кишечникъ не выступаетъ; кромѣ того опытъ доказываетъ, что эта операція лучше переносится истощенными больными, чѣмъ лапаротомія.

*Б. Фейнбергъ.*

31. Karl Heil.—Ueber die Entstehung des Hautemphysems nach Laparotomie.—(Archiv f. Gyn. Bd. 52, III).—О происхожденіи кожной эмфиземы послѣ лапаротоміи.

Какъ извѣстно многіе авторы приписываютъ происхожденіе кожной эмфиземы post laparotomiam Trendelenburg'sкому подъему таза вслѣдствіе накопленія воздуха въ полости живота, въ зависимости отъ смѣщенія кишокъ къ грудобрюшной преградѣ.