

также имѣть мѣсто при поворотѣ и извлеченіи. Точно также не исключительно щипцами обусловливаются сдавленія и поврежденія материнскихъ путей, которыя, т. е. поврежденія во всякомъ случаѣ менѣе опасны, чѣмъ тѣ, которыя бывають при поворотѣ. Само наложеніе даже на подвижную головку вовсе не трудно, и наконецъ сложная конструкція отнюдь не мѣшаетъ сдѣлать инструментъ асептическимъ.

*С. Ю. Хазанъ.*

30. G. Leopold.—Zur vaginalen Totalexstirpation des Uterus und her Annexwegen schwerer chronischer Erkrankung derselben.—(Arch. f. G. Bd. 52, III).—Къ полной экстирпаціи матки и придатковъ черезъ рукавъ при тяжеломъ хроническомъ заболѣваніи послѣднихъ.

Вслѣдствіе вышеуказанной причины L. въ теченіе десяти лѣтъ удалилъ матку съ придатками черезъ рукавъ 57 разъ. Приводятся 20 случаевъ, остальные 37 напечатаны раньше въ другомъ мѣстѣ.

Результаты: изъ 57 оперированныхъ умерла 1=1,7%.

Преимущества этой операціи при хроническихъ, тяжелыхъ, гнойныхъ и не гнойныхъ воспаленіяхъ придатковъ, по L. слѣдующія.

1) Полное изъятіе заболѣвшихъ органовъ безъ оставленія воспаленной матки, причиняющей дальнѣйшія страданія.

2) Положеніе раны внизу брюшной полости, само способствующее дренажу.

3) Операціонное поле доступно и у женщинъ не рожавшихъ (рукавно промежностные разрывы).

4) Отсутствіе брюшной раны и избѣжаніе послѣдующихъ грыжъ.

5) Операція далеко не такъ опасна какъ лапаротомія, такъ какъ кишечникъ не выступаетъ; кромѣ того опытъ доказываетъ, что эта операція лучше переносится истощенными больными, чѣмъ лапаротомія.

*Б. Фейнбергъ.*

31. Karl Heil.—Ueber die Entstehung des Hautemphysems nach Laparotomie.—(Archiv f. Gyn. Bd. 52, III).—О происхожденіи кожной эмфиземы послѣ лапаротоміи.

Какъ извѣстно многіе авторы приписываютъ происхожденіе кожной эмфиземы post laparotomiam Trendelenburg'sкому подъему таза вслѣдствіе накопленія воздуха въ полости живота, въ зависимости отъ смѣщенія кишокъ къ грудобрюшной преградѣ.