



Наибольшую любовь *S.* пользуется 50% растворъ хлористаго цинка, рекомендуемый *Bröse, Fraenkel, Rheinstädter* и пр., который одинаково пригоденъ какъ въ случаяхъ катаральныхъ, такъ и въ хронически-инфекціонныхъ и меноррагическихъ формахъ эндометрита.

Только у не рожавшихъ равно и у рожавшихъ, но имѣющихъ узкую шейку, *S.* примѣняетъ въ началѣ 10% растворъ хлористаго цинка, или 30—50% растворъ ляписа, или іодъ-алкоголь (1:5).

При метроррагическихъ формахъ эндометрита *S.* обыкновенно прибѣгаетъ прежде всего къ выскабливанію слизистой оболочки матки, примѣняя затѣмъ въ случаѣ нужды внутри маточное прижиганіе; при *Endometritis hypersecretoria* онъ примѣняетъ преимущественно внутриматочное прижиганіе, иногда присоединяя выскабливаніе.

*В. Строгановъ.*

19. *D-r Leopold v. Dittel jun. Partus bei Uterus dupelx. (Centr f. Gynaecol., 1894 г.) Роды при двойной маткѣ.*

Случай этотъ, наблюдавшійся въ клиникѣ *Хробака*, представлялъ слѣдующія явленія во время родовъ: имѣлось два влагалища, совершенно раздѣленныхъ перегородкой; въ правомъ рукавѣ опредѣлялась влагалищная часть съ слегка открытымъ наружнымъ маточнымъ зѣвомъ, напротивъ въ лѣвомъ—наружный зѣвъ былъ открытъ на 2 поперечныхъ пальца, пузырь былъ цѣль, ягодицы стояли во входѣ. При опущеніи послѣднихъ перегородка разорвалась. Ребенокъ извлеченъ живымъ, 2650 gm., 48 сант. Плацента тотчасъ вышла. Безлихорадочный послѣродовой періодъ.

При изслѣдованіи на 14-й день послѣ родовъ были констатированы 2 матки, лѣвая—пуерперальная большая и правая—небольшая. Рука глубоко проникала между ними, давая впечатлѣніе полного отсутствія между ними перегородки, напротивъ между шейками приблизительно на разстояніе 3—4 сант. имѣлась общая перегородка. Придатки, равно и *lig. recto-vesicale* не прощупывались.

Авторъ рассматриваетъ этотъ случай какъ переходную ступень къ *uterus didelphys*. Онъ отмѣчаетъ, что *Pfannenstiel* собралъ уже 12 случаевъ родовъ при *uterus didelphys*.

*В. Строгановъ.*