

153. P. Carnot.—*De l'hémostase par la gélatine.*—(La Presse médicale. 1897 г., № 77, стр. 167).—Желатина, какъ кровоостанавливающее средство.

Свойство желатины свертывать кровь указано въ 1896 году *Dastre*'омъ и *Floresco*. Получающійся отъ желатины свертокъ крови способенъ быстро организоваться. Авторъ вмѣстѣ съ *Cognil*'емъ испыталъ питательныя и всасываательныя свойства желатины и другихъ бѣлковыхъ веществъ (помѣщаа куски губки, смоченные въ этихъ веществахъ, въ брюшную полость собакъ и наблюдая вростаніе этихъ кусковъ) и пришелъ къ заключенію, что желатина занимаетъ въ этомъ отношеніи первенствующее мѣсто. Для остановки кровотечений употреблялъ онъ 5%—10% растворы желатина въ водѣ, или лучше въ физиологическомъ соляномъ растворѣ, хорошо обезложеніе при температурѣ не выше 115°. При кровотеченіи изъ матки автору пришлось лишь одинъ разъ испробовать вирсыканіе этого средства, и съ успѣхомъ,—при фибромахъ матки. Тамионы, смоченные въ растворѣ этого средства, прекрасно замѣняютъ зажимчики при раненіяхъ сосудовъ. Введенная въ вену, желатина повышаетъ свертываѣмость крови.

*H. Какушкинъ.*

154. Bonnaire.—*Placenta praevia hémorragique et accouchement méthodiquement rapide.*—(La Presse mдicale. 1897 г. № 67).—Быстрое родоразрѣшеніе при предлежаніи послѣда.

Перечисливъ условія, при которыхъ обыкновенно наступаетъ и поддерживается кровотеченіе при предлежаніи дѣтскаго мѣста, авторъ разбираетъ различныя пособія, направляемыя обыкновенно къ остановкѣ кровотеченія. Среди нихъ онъ на первомъ мѣстѣ ставить искусственный разрывъ плоднаго пузыря и влагалищную тампонацию. Второе мѣсто отводится имъ горячимъ влагалищнымъ спринцеваніямъ и внутриматочной тампонацией. Всѣ эти пособія слишкомъ недостаточно приоровлены къ обезначенію жизни плода, а нѣкоторые изъ нихъ, какъ ранній разрывъ пузыря, представляютъ даже опасность для нея. Авторъ настаиваетъ поэтому, при кровотеченіи отъ предлежанія дѣтскаго мѣста, стремиться къ опорожненію матки отъ ея содержимаго. Для этой цѣли, какъ предварительный пріемъ, необходимо насильственное расширение шеечнаго просвѣта. Лучшимъ орудіемъ для такого расширенія авторъ считаетъ пальцы акушера и совѣтуетъ операцию эту дѣлать такъ. Больная подвергается глубокому усыплѣнію; въ отверстіе наружнаго зѣва вводится указательный палецъ