DOI: <https://doi.org/10.17816/OV59309>

Результаты лечения пациентов с прогрессирующей близорукостью методом криогенной склеропластики

© Н.П. Паштаев^{1, 2}, И.Н. Григорьева¹¹ Чебоксарский филиал Федерального государственного автономного учреждения

«Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Чебоксары, Россия;

² Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», Чебоксары, Россия

Цель исследования — оценка результатов эффективности криогенной склеропластики.

Материал и методы. Было обследовано 184 ребёнка (313 глаз) (средний возраст — $11,72 \pm 3,76$ года) с прогрессирующей миопией средней и высокой степени до и после проведения криогенной склеропластики (основная группа) и склеропластики по Пивоварову (группа контроля).

Результаты. Согласно полученным в ходе двухлетнего наблюдения данным, меньшая среднегодовая разница сферозэквивалента рефракции ($\Delta C_{\text{ср}}$) и средний годовой градиент переднезадней оси ($\Delta ПЗО_{\text{ср}}$) зафиксированы в группе пациентов после криогенной склеропластики. У детей младшей возрастной подгруппы (до 9 лет) $\Delta C_{\text{ср}}$ составила $-0,48 \pm 0,45$ дптр в основной группе и $-0,51 \pm 0,34$ дптр в группе контроля; в старшей возрастной подгруппе (9 лет и старше) — $-0,35 \pm 0,31$ дптр в основной, и $-0,69 \pm 0,61$ дптр — в группе контроля ($p = 0,047$). $\Delta ПЗО_{\text{ср}}$ у детей до 9 лет основной группы составил $0,15 \pm 0,11$ мм, в группе контроля $0,31 \pm 0,14$ мм ($p = 0,016$); у детей 9 лет и старше — $0,29 \pm 0,18$ мм и $0,34 \pm 0,32$ мм соответственно.

Заключение. Разработанная технология криогенной склеропластики имеет два операционных доступа в нижневнутреннем и верхненаружном отделах глазного яблока; склеропластический материал равномерно прилегает к склере, охватывает все четыре квадранта глазного яблока; фиксируется под прямыми мышцами глаза; при сроке наблюдения 24 мес. показала хороший стабилизирующий эффект.

Ключевые слова: прогрессирующая миопия; склеропластика; переднезадняя ось глаза; рефракция.

Как цитировать:

Паштаев Н.П., Григорьева И.Н. Результаты лечения пациентов с прогрессирующей близорукостью методом криогенной склеропластики // Офтальмологические ведомости. 2021. Т. 14. № 1. С. 43–49. DOI: <https://doi.org/10.17816/OV59309>

DOI: <https://doi.org/10.17816/OV59309>

Results of treatment of myopia progression by the method of cryogenic scleroplasty

© Nikolay P. Pashtaev^{1, 2}, Irina N. Grigorieva¹

¹ S.N. Fedorov Eye Microsurgery Federal State Institution, the Cheboksary Branch, Cheboksary, Russia;

² I.N. Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary, Russia

AIM: To evaluate the results of the effectiveness of cryogenic scleroplasty.

MATERIALS AND METHODS: 184 children (313 eyes) (mean age $11,72 \pm 3,76$ years) with moderate and high progressive myopia were examined before and after cryogenic scleroplasty (main group) and Pivovarov's scleroplasty (control group).

RESULTS: A smaller average annual difference in the spherical equivalent of refraction (ΔSE_{av}) and the average annual gradient of the axial length (ΔAL_{av}) were recorded in the group of patients after cryogenic scleroplasty according to the data obtained during the two-year follow-up. ΔSE_{av} was $-0,48 \pm 0,45$ diopters in the main group and $-0,51 \pm 0,34$ diopters in the control group in children of the younger age subgroup (up to 9 years old); $-0,35 \pm 0,31$ diopters in the main group and $-0,69 \pm 0,61$ diopters in the control group ($p = 0,047$) in the older age subgroup (9 years and older). ΔAL_{av} in the main group was $0,15 \pm 0,11$ mm in children under 9 years of age, $0,31 \pm 0,14$ mm ($p = 0,016$) in the control group; $0,29 \pm 0,18$ mm and $0,34 \pm 0,32$ mm in children 9 years old and older, respectively.

CONCLUSIONS: The proposed technology of cryogenic scleroplasty has two surgical approaches in the lower-internal and upper-external parts of the eyeball; the scleroplastic material adheres evenly to the sclera, covers all four quadrants of the eyeball; it is fixed under the rectus muscles of the eye; at a 24-months follow-up period showed a good stabilizing effect.

Keywords: myopia progression; scleroplasty; axial length; refraction.

To cite this article:

Pashtaev NP, Grigorieva IN. Results of treatment of myopia progression by the method of cryogenic scleroplasty. *Ophthalmology Journal*. 2021;14(1):43-49.

DOI: <https://doi.org/10.17816/OV59309>

Received: 26.01.2021

Accepted: 17.02.2021

Published: 23.03.2021

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что прогрессирующая миопия является глобальной медико-социальной проблемой. При неблагоприятном течении значительно повышается риск развития серьёзных осложнений, приводящих к снижению зрительных функций, не поддающихся оптической и хирургической коррекции [1–3]. Анализ результатов 145 исследований с участием 2,1 млн человек прогнозирует к 2050 г. значительное увеличение распространённости миопии во всем мире и наличие близорукости высокой степени у 938 млн человек [4].

К настоящему времени известно множество теорий, объясняющих развитие и прогрессирование миопии [5, 6]. Наряду с оптическими нарушениями, неоспоримым является участие склерального фактора в патогенезе прогрессирующей близорукости. Согласно результатам биомеханических исследований Е.Н. Иомдиной, «...при прогрессировании миопии сокращается диапазон упругих деформаций склеры и даже при физиологических нагрузках происходит постепенное накопление её пластических деформаций, что в результате приводит к необратимому растяжению оболочек и к увеличению переднезадней оси глаза». По данным автора, в склере, преимущественно в области экватора и заднего полюса глаза, нарушается обмен коллагена в виде снижения содержания общего коллагена и повышения уровня его растворимых фракций, значительного снижения гликозаминогликанов, уровня поперечных внутри- и межмолекулярных связей, стабилизирующих соединительнотканную структуру склеры [7]. Очевидно, что растяжение переднезадней оси глаза и истончение наружной (склеральной) оболочки глаза не имеет адекватного ответа со стороны более высококодифференцированных оболочек (сосудистой и сетчатки). Они не способны к такому растяжению и отвечают дистрофическим процессом, в итоге снижая все зрительные функции глаза. Учитывая полиэтиологичность заболевания, лечение прогрессирующей миопии несомненно должно быть комплексным, включающим наряду с медикаментозными, функциональными (аппаратными, тренировочными) и оптическими методами лечения также и склероукрепляющие вмешательства, которые улучшают гемодинамику глаза, оказывают тканевое биостимулирующее действие с выработкой биологически активных веществ, активизируют синтез коллагена в склере, повышают её биомеханическую стабильность [8–11]. Склероукрепляющие операции способны затормозить процесс растяжения оболочек, замедлить темп прогрессирования, отсрочить или даже предотвратить развитие дистрофических осложнений [8, 12]. Существующее многообразие различных способов склероукрепляющих вмешательств [13–16] свидетельствует о поиске безопасных и эффективных методов стабилизации прогрессирования близорукости.

Цель исследования — анализ эффективности криогенной склеропластики у пациентов с прогрессирующей миопией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находились 184 ребенка с прогрессирующей миопией в возрасте от 7 до 16 лет (в среднем $11,72 \pm 3,76$ года), прооперированных в Чебоксарском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России. Среди них было 84 мальчика (45,65 %) и 100 девочек (54,35 %). Срок наблюдения составил 2 года. Детям проводили комплексное офтальмологическое обследование, включающее офтальмометрию, рефрактометрию, визометрию с оценкой некорригированной и максимально корригированной остроты зрения до и после циклоплегии, оптическую биометрию с регистрацией значения переднезадней оси глаза (ПЗО) на биометре IOL Master 500 (Carl Zeiss, Германия), тонометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, осмотр периферии глазного дна с линзами Гольдмана или Ошера, измерение количества белка и клеток воспаления во влаге передней камеры на тиндалеметре FC-2000 (Kowa, Япония), а также исследование подвижности глазных яблок, определение характера зрения на аппарате «Форбис» и четырёхточечном цветотесте Белостоцкого–Фридмана.

В основную группу вошли 96 детей (167 глаз), прооперированных методом криогенной склеропластики [17, 18]; 88 детям (146 глаз) группы контроля выполнена стандартная склеропластика по Пивоварову. По предоперационным данным исследуемые группы были сопоставимы (характеристика групп представлена в табл. 1). На 44 глазах (у 14 % детей) предварительно была выполнена профилактическая лазеркоагуляция сетчатки по поводу периферической хориоретинальной дистрофии.

Согласно литературным данным, рост переднезадней оси глаза наблюдается и в глазах с эметропией и считается нормальным. Градиент прироста ПЗО здоровых детей за 5 лет в младшей возрастной группы (7–8 лет) составил 0,58 мм, а в старшей (9–10 лет) — 0,44 мм. При развитии миопии этот показатель почти в 2,5 раза превысил значения детей с эметропией ($1,55 \pm 0,67$ и $1,13 \pm 0,32$ мм соответственно) [18]. Учитывая вышеизложенное, для корректной оценки изменений ПЗО и рефракции глаза, дети с учётом их возрастных нормативных значений были разделены на 2 возрастные подгруппы — до 9 лет и 9 лет и старше.

Суть криогенной склеропластики заключается в следующем:

1) создание операционного доступа в ниже-носовом и в верхне-височном квадрантах глазного яблока путём отсепаровки конъюнктивы и теноновой оболочки от склеры (рис. 1);

Таблица 1. Характеристика исследуемых групп, $M \pm m$ **Table 1.** Study groups characteristic, $M \pm m$

Показатель	Основная группа	Группа контроля
Общее число детей (глаз)	96 (167)	88 (146)
Возраст, лет	11,91 ± 2,78	11,66 ± 2,46
Рефракция сфера, дптр	-5,85 ± 2,22 [-4,5; -11,5]	-5,67 ± 1,54 [-3,5; -10,75]
Рефракция цилиндр, дптр	-1,04 ± 0,68	-0,96 ± 0,49
ПЗО, мм	25,98 ± 0,72 [24,40; 27,87]	25,83 ± 0,86 [24,01; 27,95]
Некорригированная острота зрения (НКОЗ)	0,04 ± 0,02	0,04 ± 0,02
Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ)	0,83 ± 0,19	0,84 ± 0,75

Рис. 1. Схема расположения разрезов конъюнктивы и теноновой оболочки (левый глаз). 1 — в нижне-носовом квадранте, 2 — в верхне-височном квадранте**Fig. 1.** Scheme of the location of the incisions of the conjunctiva and tenon capsule (left eye). 1 — in the inferio-nasal quadrant, 2 — in the superio-temporal quadrant **Рис. 2.** Схема расположения трансплантатов в нижне-носовом квадранте (левый глаз). 1 — нижняя прямая мышца, 2 — медиальная прямая мышца**Fig. 2.** Layout diagram transplants in the inferio-nasal quadrant (left eye). 1 — m. rectus inferior, 2 — m. rectus medialis **Рис. 3.** Схема расположения трансплантатов в верхне-височном квадранте (левый глаз). 1 — латеральная прямая мышца, 2 — верхняя прямая мышца**Fig. 3.** Layout diagram transplants in the superio-temporal quadrant (left eye). 1 — m. rectus lateralis, 2 — m. rectus superior

2) склеропластический материал после 10 с экспозиции в жидком азоте вводится под прямые мышцы глаза под углом 45° (рис. 2, 3).

В нижне-носовом квадранте послойно разрезают конъюнктиву и тенонову оболочку перпендикулярно лимбу, отсепаарывают тенонову оболочку от подлежащей эписклеры с целью формирования кармана под нижней и медиальной прямыми мышцами. Трансплантат («Материал для склеропластики» ООО «НЭП МГ», Москва, ТУ 9398-001-29039336-2011) размерами 20 × 10 мм заводят под нижнюю прямую мышцу после предварительной экспозиции в растворе жидкого азота в течение 10 с. Через этот же разрез второй склеропластический материал после экспозиции в растворе жидкого азота заводят под медиальную прямую мышцу. При этом трансплантаты погружают за экватор под углом 45° к нижней и медиальной прямым мышцам. Второй разрез конъюнктивы производят в верхне-височном квадранте. Материал для склеропластики после экспозиции в растворе жидкого азота заводят под латеральную прямую мышцу, погружая за экватор под углом 45° к мышце. Через этот же разрез заводят следующий трансплантат за экватор, верхний конец его погружая под верхнюю прямую мышцу, а нижний конец ориентируют

в косом направлении под углом 45° в сторону латеральной прямой мышцы, с таким расчётом, чтобы закрыть зону прикрепления верхней косой мышцы. На разрезы конъюнктивы накладывают погружные швы 8/0 (см. видео «Криогенная склеропластика», <https://journals.eco-vector.com/ov/copyeditor/downloadFile/59309/131708>).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Все оперативные вмешательства выполнены без осложнений, послеоперационный период протекал практически адекватно, каких-либо побочных реакций на применяемый склеропластический материал не отмечено. В первые дни после операции у части детей наблюдались незначительная светобоязнь, умеренная болевая реакция при движении глазными яблоками. Выраженность данных проявлений в исследуемых группах была примерно одинаковой. У 2 пациентов основной группы (2 %) наблюдался небольшой хемоз конъюнктивы. Характер зрения у детей оставался бинокулярным, ограничений подвижности глазных яблок не отмечено. Тиндалеметрические показатели в исследуемых группах в послеоперационном периоде оставались в пределах

Таблица 2. Среднегодовая разница сферозэквивалента рефракции, дптр (ΔC_{cp})**Table 2.** Average annual difference in the spheroequivalent of refraction, D (ΔSE_{av})

Подгруппа	Срок наблюдения	Основная группа	Группа контроля
1	До операции	$-4,84 \pm 1,4$	$-4,91 \pm 1,12$
	1 год	$-5,16 \pm 1,34$	$-5,47 \pm 1,13$
	2 года	$-5,60 \pm 1,35$	$-5,84 \pm 2,24$
	ΔC_{cp}	$-0,48 \pm 0,45$	$-0,51 \pm 0,34$
$p = 1,0$			
2	До операции	$-6,25 \pm 1,96$	$-6,01 \pm 1,81$
	1 год	$-6,53 \pm 2,10$	$-6,61 \pm 1,83$
	2 года	$-6,78 \pm 1,99$	$-6,96 \pm 2,24$
	ΔC_{cp}	$-0,35 \pm 0,31$	$-0,69 \pm 0,61$
$p = 0,047$			

Таблица 3. Средний годовой градиент переднезадней оси ($\Delta ПЗО_{cp}$)**Table 3.** Average annual gradient axial length (ΔAL_{av})

Подгруппа	Срок наблюдения	Основная группа	Группа контроля	Дети с эмметропией
1	До операции	$25,12 \pm 0,32$	$25,09 \pm 0,58$	—
	1 год	$25,23 \pm 0,65$	$25,47 \pm 0,35$	—
	2 года	$25,40 \pm 0,33$	$25,73 \pm 0,29$	—
	$\Delta ПЗО_{cp}$	$0,15 \pm 0,11$	$0,31 \pm 0,14$	$0,132 \pm 0,02^*$
$p = 0,016$				
2	До операции	$25,96 \pm 0,66$	$25,84 \pm 1,55$	—
	1 год	$26,24 \pm 0,21$	$26,26 \pm 1,11$	—
	2 года	$26,55 \pm 0,72$	$26,59 \pm 0,29$	—
	$\Delta ПЗО_{cp}$	$0,29 \pm 0,18$	$0,34 \pm 0,32$	$0,076 \pm 0,07^*$
$p = 0,74$				

*Ситка М.М. Сравнительный анализ различных способов долгосрочной оптической коррекции прогрессирующей миопии у детей и подростков: дис. ... канд. мед. наук. М., 2018. 158 с.

нормы: средний показатель потока белка у пациентов основной группы составил $3,6 \pm 0,07$ ф/мс, у пациентов контрольной группы — $3,4 \pm 1,6$ ф/мс (норма до 5 ф/мс).

Основными показателями в контроле прогрессирования миопии можно считать величину ПЗО и объективную рефракцию [8]. Согласно полученным в ходе двухлетнего наблюдения данным, у детей 1-й подгруппы среднегодовая разница сферозэквивалента рефракции (ΔC_{cp}) составила $-0,48 \pm 0,45$ дптр в основной группе и $-0,51 \pm 0,34$ дптр в группе контроля. Во 2-й подгруппе изменение ΔC_{cp} составило $-0,35 \pm 0,31$ дптр в основной и $-0,69 \pm 0,61$ дптр в группе контроля (табл. 2).

Средний годовой градиент ПЗО ($\Delta ПЗО_{cp}$) у детей 1-й подгруппы основной группы составил $0,15 \pm 0,11$ мм, в группе контроля — $0,31 \pm 0,14$ мм. Во 2-й подгруппе — $0,29 \pm 0,18$ и $0,34 \pm 0,32$ мм соответственно (табл. 3).

По результатам нашего исследования меньшая среднегодовая разница сферозэквивалента рефракции

(статистически значимая в подгруппе 9 лет и старше) и средний годовой градиент ПЗО (статистически значимый в подгруппе до 9 лет) зафиксированы в группе пациентов после криогенной склеропластики. Благодаря экспозиции трансплантата в растворе жидкого азота он держит форму и не деформируется в процессе погружения и размещения на поверхности склеры. Расположение под мышцами обеспечивает плотность контакта со склерой и фиксацию лоскутов. Локальная гипотермия после сосудистого спазма в последствии приводит к расширению сосудов с увеличением интенсивности местного кровотока, усиливает асептическое воспаление и иммунную реакцию в ответ на трансплантацию и хирургическое вмешательство. Все изложенное способствует более прочному сращению трансплантата со склерой и в итоге определяет биомеханическую устойчивость комплекса «склера–трансплантат».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, разработанная технология криогенной склеропластики хирургического лечения при прогрессирующей близорукости имеет два, вместо традиционных четырёх, операционных доступа — в нижне-носовом и верхне-височном отделах глазного яблока. Склеропластический материал фиксируется под прямыми мышцами глаза, охватывает все четыре квадранта глазного яблока, равномерно прилегая к склере. При сроке наблюдения 24 мес. получен стабилизирующий эффект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нероев В.В. Организация офтальмологической помощи населению Российской Федерации // Вестник офтальмологии. 2014. Т. 130, № 6. С. 8–12.
2. Катаргина Л.А., Михайлова Л.А. Состояние детской офтальмологической службы Российской Федерации (2012–2013 гг.) // Российская педиатрическая офтальмология. 2015. № 1. С. 5–10.
3. Fricke T.R., Jong M., Naidoo K.S., et al. Global prevalence of visual impairment associated with myopic macular degeneration and temporal trends from 2000 through 2050: systematic review, meta-analysis and modeling // Br J Ophthalmol. 2018. Vol. 102, No. 7. P. 855–862. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2017-311266
4. Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. *Ophthalmology*. 2016. Vol. 123, No. 5. P. 1036–1042. DOI: 10.1016/j.ophtha.2016.01.006
5. Тарутта Е.П., Проскурина О.В., Тарасова Н.А., и др. Предикторы миопии как отправная точка для начала активных мер по предупреждению её развития // Российский офтальмологический журнал. 2018. Т. 11, № 3. С. 107–112. DOI: 10.21516/2072-0076-2018-11-3-107-112
6. Тарутта Е.П., Проскурина О.В., Маркосян Г.А., и др. Стратегически ориентированная концепция оптической профилактики возникновения и прогрессирования миопии // Российский офтальмологический журнал. 2020. Т. 13, № 4. С. 7–16. DOI: 10.21516/2072-0076-2020-13-4-7-16
7. Иомдина Е.Н. Биомеханика склеральной оболочки глаза при миопии: диагностика нарушений и их экспериментальная коррекция: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. М., 2000. 48 с. Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30190377>. Дата обращения: 21.01.2021.
8. Аветисов С.Э., Кащенко Т.П., Шамшинова А.М. Зрительные функции и их коррекция у детей: руководство для врачей. М.: Медицина, 2005. 872 с.
9. Корниловский И.М. Патогенетические аспекты стабилизации миопии после склеропластических операций // Офтальмологический журнал. 1987. Т. 42, № 6. С. 343–347.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. Н.П. Паштаев — концепция и дизайн исследования, научное и методическое редактирование, хирургическое лечение, окончательное одобрение варианта статьи для опубликования; И.Н. Григорьева — сбор и обработка материала, диагностическое исследование, написание текста, обзор литературы.

Источник финансирования. Не указан.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

10. Тарутта Е.П., Маркосян Г.А., Сианосян А.А., Милаш С.В. Толщина хориоидеи при различных видах рефракции и её динамика после склероукрепляющих операций // Российский офтальмологический журнал. 2017. Т. 10, № 4. С. 48–53. DOI: 10.21516/2072-0076-2017-10-4-48-53
11. Иомдина Е.Н., Андреева Л.Д. Биомеханическое и морфологическое изучение отдалённых результатов склероукрепляющей инъекции в эксперименте. В сб. Патология оптических сред глаза. М., 1989. С. 127–130.
12. Аветисов С.Э., Фридман Ф.Е., Саксонова Е.О., и др. Роль растяжения склеры в генезе миопических витреохориоретинальных дистрофий // Офтальмологический журнал. 1988. Т. 43, № 3. С. 137–138.
13. Елисеева Е.В. Склероукрепляющие операции: учебное пособие. Караганда, 2007.
14. Тарутта Е.П. Выбор метода склеропластики при прогрессирующей близорукости у детей // Вестник офтальмологии. 1992. Т. 108, № 2. С. 10–13.
15. Gerinec A., Slezakova G. Posterior scleroplasty in children with severe myopia // Bratisl Lek Lisky. 2001. Vol. 102, No. 2. P. 73–80.
16. Wollensak G., Iomdina E. Long-term biomechanical properties of rabbit sclera after collagen crosslinking using riboflavin and ultraviolet A (UVA) // Acta Ophthalmol. 2009. Vol. 87. P. 193–198. DOI: 10.1111/j.1755-3768.2008.01229.x
17. Патент РФ на изобретение 2697240/30.08.2018. Паштаев Н.П., Григорьева И.Н., Шахматова И.П. Способ хирургического лечения прогрессирующей миопии. Режим доступа: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet. Дата обращения: 21.01.2021.
18. Паштаев Н.П., Григорьева И.Н. Предварительные результаты модифицированной криогенной склеропластики // Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 2. С. 515–517.
19. Ситка М.М., Бодрова С.Г., Тихонова О.И., и др. Оценка влияния изменений параметров глаза у детей с исходной эметропией на развитие миопии // Офтальмология. 2020. Т. 17, № 2. С. 263–268. DOI: 10.18008/1816-5095-2020-2-263-268

REFERENCES

1. Neroev VV. Eye care management in Russian Federation. *The Russian Annals of Ophthalmology*. 2014;130(6):8–12. (In Russ.)
2. Katargina LA, Mikhailova LA. The current stage of the ophthalmological care service in the Russian Federation (2012–2013). *Russian Pediatric Ophthalmology*. 2015;(1):5–10. (In Russ.)
3. Fricke TR, Jong M, Naidoo KS, et al. Global prevalence of visual impairment associated with myopic macular degeneration and temporal trends from 2000 through 2050: systematic review, meta-analysis and modelling. *Br J Ophthalmol*. 2018;102(7):855–862. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2017-311266
4. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. *Ophthalmology*. 2016;123(5):1036–1042. DOI: 10.1016/j.ophtha.2016.01.006.
5. Tarutta EP, Proskurina OV, Tarasova NA, et al. Myopia predictors as a starting point for active prevention of myopia development. *Russian Ophthalmological Journal*. 2018;11(3):107–112. (In Russ.) DOI: 10.21516/2072-0076-2018-11-3-107-112
6. Tarutta EP, Proskurina OV, Markossian GA, et al. A strategically oriented conception of optical prevention of myopia onset and progression. *Russian Ophthalmological Journal*. 2020;13(4):7–16. (In Russ.) DOI: 10.21516/2072-0076-2020-13-4-7-16
7. Iomdina EN. *Biomehanika skleral'noj obolchki glaza pri miopii: diagnostika narushenij i ih jeksperimental'naja korrekcija* [dissertation]. Moscow, 2000. 48 p. Available from: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30190377>. (In Russ.)
8. Avetisov SE, Kashhenko TP, Shamshinova AM. *Zritel'nye funkcii i ih korrekcija u detej: rukovodstvo dlja vrachej*. Moscow: Medicina, 872 p. (In Russ.)
9. Kornilovskij IM. Patogeneticheskie aspekty stabilizacii miopii posle skleroplasticheskikh operacij. *Journal of Ophthalmology*. 1987;42(6):343–347. (In Russ.)
10. Tarutta EP, Markossian GA, Sianosyan AA, Milash SV. Choroidal thickness in varied types of refraction and its changes after sclera strengthening surgeries. *Russian Ophthalmological Journal*. 2017;10(4):48–53. (In Russ.) DOI: 10.21516/2072-0076-2017-10-4-48-53
11. Iomdina EN, Andreeva LD. Biomechanicheskoe i morfologicheskoe izuchenie otdalennykh rezul'tatov skleroukreplajushhej injekcii v jeksperimente. In: *Patologija opticheskikh sred*. Moscow; 1989. P. 127–130. (In Russ.)
12. Avetisov SE, Fridman FE, Saksonova EO, et al. Rol' rastjazhenija sklery v geneze miopicheskikh vitreohorioretinal'nykh distrofij. *Journal of Ophthalmology*. 1988;43(3):137–138. (In Russ.)
13. Eliseeva EV. *Skleroukreplajushhie operacii: uchebnoe posobie*. Karaganda, 2007. (In Russ.)
14. Tarutta EP. Vybora metoda skleroplastiki pri progressirujushhej blizorukosti u detej. *The Russian Annals of Ophthalmology*. 1992;108(2):10–13. (In Russ.)
15. Gerinec A, Slezakova G. Posterior scleroplasty in children with severe myopia. *Bratisl Lek Lisky*. 2001;102(2):73–80.
16. Wollensak G, Iomdina E. Long-term biomechanical properties of rabbit sclera after collagen crosslinking using riboflavin and ultraviolet A (UVA). *Acta Ophthalmol*. 2009;87:193–198. DOI: 10.1111/j.1755-3768.2008.01229.x
17. Patent RUS2697240/30.08.2018 Pashtaev NP, Grigor'eva IN, Shahmatova IP. *Sposob hirurgicheskogo lechenija progressirujushhej miopii*. Available from: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet. (In Russ.)
18. Pashtaev NP, Grigorieva IN. Preliminary results of modified cryogenic scleroplasty. *Saratov Journal of Medical Scientific Research*. 2019;15(2):515–517. (In Russ.)
19. Sitka MM, Bodrova SG, Tikhonova OI, et al. Assessment of influence of various eye parameters in emmetropia children on myopia development. *Ophthalmology in Russia*. 2020;17(2):263–268. (In Russ.) DOI: 10.18008/1816-5095-2020-2-263-268

ОБ АВТОРАХ

***Николай Петрович Паштаев**, д-р мед. наук, профессор;
адрес: Россия, 428028, Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 10;
ORCID: <https://orcid.org/000-0003-2324-8044>;
eLibrary SPIN: 9629-3161; e-mail: pashtaevnp@gmail.com

Ирина Николаевна Григорьева, врач-офтальмолог;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1107-9810>;
eLibrary SPIN: 4635-3437; e-mail: grigir09@mail.ru

AUTHORS INFO

***Nikolay P. Pashtaev**, Dr. Sci. (Med.), professor;
address: 10, Traktorostroiteley str., Cheboksary, 428028, Russia;
ORCID: <https://orcid.org/000-0003-2324-8044>;
eLibrary SPIN: 9629-3161; e-mail: pashtaevnp@gmail.com

Irina N. Grigorieva, ophthalmologist;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1107-9810>;
eLibrary SPIN: 4635-3437; e-mail: grigir09@mail.ru