DOI: <https://doi.org/10.17816/uroved65153>

Сирингоцеле Купера (бульбоуретральная киста)

© В.В. Протоцак, А.А. Сиваков, С.М. Гозалишвили, В.К. Карандашов, А.Е. Горбунов

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Сирингоцеле Купера (от греч. *syringo* — труба, *cele* — расширение), или бульбоуретральная киста, — это кистозное расширение выводных протоков бульбоуретральных желез (куперовых желез). Встречается данное заболевание крайне редко и чаще диагностируется у детей. Клинические проявления сирингоцеле Купера неспецифичны и зависят от многих факторов: размеров, локализации, сообщения с уретрой, наличия инфекционного процесса. Выявление сирингоцеле невозможно без применения специальных лучевых и эндоскопических методов диагностики. Чаще всего данная патология «маскируется» под воспалительные заболевания половых органов ввиду того, что симптоматика ограничивается выделениями из наружного отверстия уретры, изменениями в общем анализе мочи и дизурическими проявлениями. В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе не наберется и 20 публикаций, посвященных данной патологии.

Ключевые слова: бульбоуретральная киста; бульбоуретральная железа; куперова железа; сирингоцеле.

Как цитировать:

Протоцак В.В., Сиваков А.А., Гозалишвили С.М., Карандашов В.К., Горбунов А.Е. Сирингоцеле Купера (бульбоуретральная киста) // Урологические ведомости. 2021. Т. 11. № 2. С. 175–182. DOI: <https://doi.org/10.17816/uroved65153>

DOI: <https://doi.org/10.17816/uroved65153>

Cooper's syringocele (bulbourethral cyst)

© Vladimir V. Protoshchak, Aleksei A. Sivakov, Sergej M. Gozalishvili,
Vasilii K. Karandashov, Alexandr E. Gorbunov

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia

Bulbourethral cyst or Cowper's syringocele (from the Greek "syringe" – tube, "cele" – expansion) is a cystic expansion of the excretory ducts of the bulbourethral glands (Cowper's glands). This disease is extremely rare and is more often diagnosed in the child population. The clinical manifestations of syringocele are non-specific and depend on many factors: size, localization, communication with the urethra, and the presence of an infectious component. Detection of syringocele is impossible without the use of special radiation and endoscopic diagnostic methods. Most often, this pathology is "masked" under inflammatory diseases of the genitals due to the fact that the symptoms are limited to secretions from the external opening of the urethra, changes in the general analysis of urine and dysuric manifestations. Currently in the domestic and foreign literature there are not even 20 publications devoted to this pathology.

Keywords: bulbourethral cyst; bulbourethral glands; Cowper's glands; syringocele.

To cite this article:

Protoshchak VV, Sivakov AA, Gozalishvili SM, Karandashov VK, Gorbunov AE. Cooper's syringocele (bulbourethral cyst). *Urology reports (St. Petersburg)*. 2021;11(2):175-182. DOI: <https://doi.org/10.17816/uroved65153>

Received: 16.04.2021

Accepted: 30.05.2021

Published: 23.06.2021

ВВЕДЕНИЕ

Первое упоминание о бульбоуретральных железах встречается в работе Jean Mery в 1684 г. (рис. 1, а). В дальнейшем они более детально описаны Уильямом Купером (William Cowper) (рис. 1, б) в своем труде «An account of two glands and their Excretory ducts lately discovered in Human Bodies» («Рассказ о двух железах и их выводных протоках, недавно обнаруженных в человеческих телах»), опубликованном в записках Лондонского Королевского Общества в 1699 г. У. Купер изобразил их (рис. 2) и описал следующим образом: «...на четверть дюйма ниже предстательной железы я обнаружил две другие маленькие железы, расположенные по обе стороны уретры немного выше луковицы пещеристого тела. Эти железы имеют овальную фигуру, не превышающую величину небольшого французского боба...» [1].

Бульбоуретральные железы — парный орган округлой формы, размером до нескольких миллиметров, расположенные кзади от мембранозной уретры, ориентировочно на 3 и 9 часах условного циферблата с выводными протоками, открывающимися в бульбозном отделе уретры. Основная их функция — выделение презеркулята в половые пути мужчины [2, 3].

Сирингоцеле Купера впервые описал М. Maizels в 1983 г., который в последующем предложил подразделять их на четыре типа: простое, перфоративное,

неперфоративное и разорвавшееся [4]. Среди описанных М. Maizels форм сирингоцеле Купера наиболее трудное для распознавания неперфоративное, которое клинически может протекать в большинстве случаев бессимптомно. Разница между простым, перфоративным и разорвавшимся сирингоцеле Купера заключается лишь в степени расширения выходного протока бульбоуретральной железы и наличием или отсутствием «окна», сообщающим его с уретрой. R. Bevers с соавт. [5] предложили упрощенную классификацию (рис. 3), включающую в себя два типа сирингоцеле Купера: открытое и закрытое.

Для открытого типа сирингоцеле Купера характерны боль в промежности, выделения из наружного отверстия уретры, рецидивирующая инфекция мочевыводящих путей и постмикционное подтекание. При закрытом варианте наиболее часто встречаются боль в промежности, дизурия и обструктивная симптоматика [6].

Проанализировав данные 15 пациентов с сирингоцеле Купера, Р. Campobasso с соавт. [7] предложили в зависимости от клинических проявлений подразделять бульбоуретральные кисты на обструктивные и необструктивные. При этом была выявлена следующая закономерность: для необструктивных сирингоцеле более характерными симптомами являются рецидивирующая инфекция нижних мочевых путей, гематурия, лихорадка, постмикционное подтекание мочи, тогда как для обструктивных — признаки инфравезикальной обструкции

(24)
DES SCAVANS.
OBSERVATIONS ANATOMIQUES FAITES PAR
M. Mery del Acad. R. des Sciences, & Chirurgien Ma-
jor des Invalides.

L'N voyant une Chatte, il a observé que la prunelle
des yeux qui étoit fort ovale; devint ronde; &
qu'elle se dilata encore plus à mesure que cet animal ap-
prochoit de la mort; jusques à ce qu'elle eût enfin ac-
quis toute la dilatation dont elle paroïssoit capable. Exa-
minant les yeux de cette Chatte, tandis qu'ils étoient
encore enfoncés dans l'eau, ils lui parurent entie-
rement vuidés, n'y pouvant remarquer ny les humeurs
aqueuse & vitrée, ny le cristallin; mais il vit clairement
tout le fonds de l'œil avec les différentes couleurs de la
Coroïde. Il apperçut aussitôt le trou de l'insertion du nerf
optique, d'où partoient les vaisseaux qui s'étendoient sur
le fonds de l'œil. Il ne lui fut pas possible de voir la ré-
tine à cause de la transparence. Cét œil étant tiré hors
de l'eau, on n'en voyoit plus le fonds, & il parut comme
on a coutume de le voir dans les Chats vivans; ex-
cepté que la prunelle conserva toujours la dilatation que
l'animal lui avoit donnée en mourant. On expliquera
ce Phenomene dans un des Journaux suivans.

M. Mery a aussi decouvert dans l'Homme sous la par-
tie virile, deux petites glandes de la grosseur d'un pois.
Elles sont placées au dessus des muscles accelerateurs, &
éloignées du corps des Prostates d'environ un poulce. Il
y a entre elles une distance d'environ deux lignes.

NOUVEAUTEZ DE LA QUINZAINÉ;
Gazophilicium linguae Persarum, triplici linguarum
clavi Italica, Latina, Gallica, nec non specialibus ejus-
dem linguae praeceptis referatur. fol. Amstelodami.

Observations sur les fièvres & les febrifuges. par M.
Spon Doct. Med. aggregé au Coll. de Lyon & Acad. de

[364]

1. An Account of two Glands and their Excretory
Ducts lately discover'd in Human Bodies. By
Mr. William Cowper. F.R.S.

NOTwithstanding the general application of the
Learned in this Age to Anatomy, and the
successes wherewith they have cultivated it,
there remain undoubtedly many considerable
Discoveries to be made, many useful Organs to be de-
tected, of great consequence to the right understand-
ing of the Animal Oeconomy; for the knowledge
of which perhaps Posterity shall be obliged to the suc-
cessful Labours of those that shall come after us, and
wonder how they escap'd our Observation, as we have
done by those that preceded us. Of this the Discove-
ry of two Glands (not before that we know taken no-
tice of in a Humane Subject) may be an Instance,
especially since they are found in a part that has not
only been accurately describ'd by others, but fre-
quently and carefully examin'd by my self before I
took notice of them. This may encourage us not to
despond, if we don't find all our Enquiries attend-
ed with Discoveries, nor to set an over-value upon our
selves for those which our good Fortune may present us
with; since it is sometimes the misfortune of Men of
greater Application and Sagacity than our selves to
meet with Disappointments.

About a quarter of an Inch below the Prostatae Glands.
(Fig. 1. E.) I found two other small Glands (ib. G G)
placed on each side the Urethra (ib. F) a little above
the

Рис. 1. Страницы изданий с описанием бульбоуретральных желез: а — первое описание Jean Mery из французского издания «Journal des scavans» (1684); б — титульный лист труда W. Cowper «An Account of Two Glands and Their Excretory Ducts lately Discover'd in Human Bodies» (1699)

Fig. 1. Page of editions describing the bulbourethral glands: а — the first description of Jean Mery from the French edition of the Journal des scavans (1684); б — title page of W. Cowper's work "An Account of Two Glands and Their Excretory Ducts lately Discover'd in Human Bodies" (1699)

Рис. 2. Органоконплекс малого таза мужчи-
ны (по: W. Cowper, 1699). 1 — предстатель-
ная железа, 2 — бульбоуретральные желе-
зы, 3 — уретра, 4 — семенные пузырьки

Fig. 2. Organocomplex of the small pelvis
of a man according (to: W. Cowper, 1699).
1 — prostate gland, 2 — bulbourethral glands,
3 — urethra, 4 — seminal vesicles

Рис. 3. Типы синрингоцеле Купера по R. Bevers [5]: *a* — закрытое; *b* — открытое

Fig. 3. Types of Cowper's syringocele according to R. Bevers [5]: *a* – closed; *b* – open

по данным урофлоуметрии и ультразвукового исследования.

Клинические проявления заболевания весьма вариabильны и зависят, в основном, от его типа. Симптоматика, развивающаяся у пациентов с синрингоцеле Купера, схожа с симптомами нижних мочевых путей: императивные позывы, постмикционное подтекание мочи, недержание мочи, рецидивирующая инфекция мочевыводящих путей, гематурия, выделения из уретры. Постмикционное подтекание мочи более характерно для «открытого» синрингоцеле, причем его интенсивность зависит от конфигурации кисты, ее хода и глубины подлегания [5].

Диагностика бульбоуретральной кисты основывается на тщательном сборе анамнеза и жалоб пациента с учетом его возраста, подкрепленных данными лучевых и эндоскопических методов обследования. J. Melquist с соавт. [6] предложили простой алгоритм диагностики синрингоцеле. Однако, на наш взгляд, данный подход целесообразно дополнить проведением дифференциальной диагностики с такими заболеваниями, как мочекаменная болезнь, воспалительные заболевания нижних мочевых путей и мужских половых органов, стриктура уретры, а также с новообразованиями органов малого таза (рис. 4).

У пациентов с синрингоцеле Купера в общем анализе мочи и бактериологическом посеве мочи на микрофлору достаточно часто определяется лейкоцитурия и бактериурия [8]. Ультразвуковое исследование информативно при закрытых бульбоуретральных кистах, когда определяется полость. Если же синрингоцеле открытое и на момент выполнения исследования опорожнено, то данный метод диагностики может оказаться неинформативным [9]. Магнитно-резонансная томография (МРТ) малого таза, дополненная исследованием уретры, обладает высокой чувствительностью и специфичностью, так как позволяет достоверно визуализировать полость кисты и определить ее взаимосвязь с мочеиспускательным каналом [10].

Рис. 4. Предлагаемый алгоритм диагностики синрингоцеле Купера

Fig. 4. Proposed algorithm for the diagnosis of Cowper's syringocele

При выполнении уретроскопии можно диагностировать открытое сириngoцеле путем визуализации «окна» — дефекта стенки мочеиспускательного канала. Для закрытого характерно пролабирование стенки кисты в просвет уретры в случае, если объемное образование достаточно заполнено жидкостным содержимым. Большинство авторов склоняется к мнению, что уретроскопия с МРТ — это наиболее информативные методы диагностики сириngoцеле Купера [6, 10].

Согласно данным литературы, бессимптомные бульбоуретральные кисты чаще всего подвергаются спонтанной регрессии и уменьшаются в размерах, опорожняясь на фоне проводимой консервативной терапии. В то же время симптоматические кисты требуют хирургического вмешательства [11]. Для оперативного лечения пациентов с сириngoцеле Купера в настоящее время применяют как открытый промежностный доступ, так и эндоскопические методики с использованием электро- и лазерохирургии, заключающиеся в иссечении передней стенки бульбоуретральной кисты или ее вскрытии и марсупиализации [12, 13]. R. Bevers и соавт. [5] сообщили о нескольких пациентах, перенесших трансуретральное рассечение передней стенки бульбоуретральной кисты с безрецидивным периодом наблюдения 23 мес. При рецидиве заболевания после трансуретрального рассечения передней стенки кисты B. Santin с соавт. [14] предложили чреспромежностную перевязку протоков бульбоуретральных желез. Промежностное иссечение бульбоуретральной кисты оправдано лишь при больших ее размерах и рецидиве после трансуретральной резекции. В то же время насколько большим должен быть объем кисты авторы не указывают [15].

Имеются единичные сообщения об успешном лапароскопическом лечении пациентов с сириngoцеле Купера и склеротерапией «закрытой» кисты промежностным способом под УЗ-навигацией с введением в ее полость полусинтетического антибиотика из группы тетрациклинов — миноциклина гидрохлорида. В случае с лапароскопическим иссечением бульбоуретральной кисты M. Cerqueira

с соавт. описали клинический опыт хирургического лечения при сириngoцеле Купера больших размеров ($10 \times 10 \times 8$ см, объемом 415 мл), пролабирующего из малого таза в брюшную полость и позволяющего, таким образом, осуществить трансперитонеальный доступ к нему [16, 17].

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Пациент Ш., 19 лет, поступил в клинику урологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в августе 2020 г. с жалобами на периодическую тупую тянущую боль по ходу мочеиспускательного канала при мочеиспускании и дискомфорт в промежности. Из анамнеза известно, что вышеуказанные беспокойства возникли около двух недель назад после перенесенного переохлаждения. При пальцевом ректальном исследовании: предстательная железа умеренно увеличена в размерах, без участков флюктуации. При бимануальном исследовании: умеренная болезненность в промежности. Показатели общеклинического и биохимического анализа крови в пределах референтных значений. В общем анализе мочи определялась лейкоцитурия до 15–20 в поле зрения. При бактериологическом исследовании мочи получен рост *Corynebacterium glucuronolytic* 5×10^3 КОЕ/мл. По данным ультразвукового исследования почек и мочевого пузыря патологических изменений не выявлено, объем предстательной железы 23,1 см³, остаточной мочи нет. При урофлоуметрии максимальная скорость мочеиспускания 33,7 мл/с, средняя скорость мочеиспускания 15,1 мл/с, время мочеиспускания 32,3 с, объем выделенной мочи 468,7 мл (рис. 5).

Пациенту был установлен диагноз: «Острый простатит». Проведен курс антибактериальной терапии (левофлоксацин в дозе 500 мг 1 раз в сутки 10 дней), противовоспалительной терапии (диклофенак по 100 мг ректально в течение 7 дней), терапия альфа-адреноблокаторами (тамсулозин в дозе 0,4 мг в сутки, 10 дней). Достигнута нормализация лабораторных показателей, однако по-прежнему оставалась периодическая боль в промежности при мочеиспускании.

Рис. 5. Урофлоуграмма пациента Ш., 19 лет

Fig. 5. Uroflowgram of patient Sh., 19 years old

Рис. 6. Пациент Ш., 19 лет: *a* — восходящая уретрограмма, определяется дефект наполнения, соответствующий расположению бульбоуретральной кисты (указан стрелкой); *b, c* — магнитно-резонансная томограмма малого таза, в двух проекциях определяется кистозное образование — сирингоцеле с тонкими перегородками (указано стрелками)

Fig. 6. Patient Sh., 19 years old: *a* — ascending urethrogram of the filling defect corresponding to the location of the bulbourethral cyst is determined (indicated by the arrow); *b, c* — magnetic resonance imaging of the small pelvis, in two projections a cystic formation is determined — a syringocele with thin septa (indicated by arrows)

Рис. 7. Уретроскопическая картина пациента Ш., 19 лет: *a* — передняя стенка бульбоуретральной кисты; *b* — перегородка в кисте (указаны стрелками)

Fig. 7. Urethroscopic picture of patient Sh., 19 years old: *a* — the anterior wall of the bulbourethral cyst; *b* — the septum in the cyst (indicated by arrows)

Рис. 8. Пациент Ш., 19 лет: *a* — уретроскопическая картина (стрелкой указано «окно» опорожненной кисты); *b* — контрольная магнитно-резонансная томограмма малого таза без признаков кистозного расширения (стрелкой указано место ранее расположенной кисты)

Fig. 8. Patient Sh., 19 years old: *a* — urethroscopic picture of (the arrow indicates the “window” of the emptied cyst); *b* — control magnetic resonance imaging of the small pelvis without signs of cystic enlargement (the arrow indicates the place of the previously located cyst)

Учитывая сохраняющиеся жалобы, через 2 мес. после выписки из урологического стационара при купированном воспалительном процессе в предстательной железе пациенту было проведено дообследование с целью

дифференциальной диагностики согласно представленному выше алгоритму с выполнением восходящей уретрографии, МРТ малого таза и наружных половых органов, уретроскопии (рис. 6).

При выполнении восходящей уретрографии уретра была проходима на всем протяжении, в бульбозном отделе по вентральной поверхности определялся дефект наполнения с четкими ровными контурами размерами до $0,4 \times 4,0$ см без затеков контрастного вещества с последующим попаданием препарата в мочевой пузырь (рис. 6, *a*).

По данным МРТ на 3,5 см дистальнее шейки мочевого пузыря парауретрально по срединной линии визуализировалось кистозное образование, не сообщающееся с мочеиспускательным каналом, размерами $4,2 \times 1,3 \times 1,5$ см. Внутренняя структура кисты разделена тремя тонкими перегородками с однородным жидкостным содержимым.

При уретроскопии в бульбозном отделе определялась передняя стенка сирингоцеле Купера, пролабирующая в просвет уретры (рис. 7).

На основании проведенного дообследования установлен диагноз: «Закрытая бульбоуретральная киста».

После проведения консервативной терапии нестероидными противовоспалительными средствами и альфа-адреноблокаторами в течение месяца симптоматика регрессировала. При контрольном обследовании через 3 мес. по данным уретроскопии определялось точечное «окно» в мочеиспускательном канале — признак «открытого» сирингоцеле, а МРТ показала отсутствие ранее наблюдавшихся жидкостных образований (рис. 8).

С учетом отсутствия симптоматики, «открытой» формы сирингоцеле Купера и молодого возраста пациент был выписан под амбулаторное наблюдение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ввиду крайне редкой встречаемости единого и четкого алгоритма диагностики и лечения пациентов

с синингоцеле Купера в настоящее время не существует. Несмотря на это, при обследовании мужчин, мальчиков и подростков с признаками воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы или симптомами инфравезикальной обструкции, необходимо помнить о данной патологии. На наш взгляд, для дифференциальной диагностики синингоцеле Купера помимо физического обследования, дополненного бимануальным исследованием, целесообразно выполнение как лучевых (ультразвуковое исследование, МРТ с контрастным усилением), так и эндоскопических (уретроцистоскопия) методов исследования в соответствии с модифицированным нами алгоритмом обследования.

При проведении консервативной терапии можно добиться регрессии размеров кисты или ее

самопроизвольного вскрытия в просвет мочеиспускательного канала. При выборе хирургического метода лечения необходимо помнить, что показаниями к операции являются выраженный болевой синдром, признаки инфравезикальной обструкции и нагноение кисты, доказанные лучевыми методами диагностики. При этом предпочтение в первой линии хирургического лечения синингоцеле Купера следует отдавать эндоскопическим методам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cowper W. An Account of Two Glands and Their Excretory Ducts Lately Discover'd in Human Bodies // The Royal Society. 1699. P. 364–369.
2. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека. 7-е изд. СПб.: СпецЛит, 2011. С. 423.
3. Wein A., Kavoussi L., Partin A., Peters C. Campbell-Walsh Urology. 11 ed. Elsevier, 2015. 4186 p.
4. Maizels M., Stephens F.D., King L.R., Firlit C.F. Cowper's syringocele: a classification of dilatations of Cowper's gland duct based upon clinical characteristics of 8 boys // J Urol. 1983. Vol. 129, No. 1. P. 111–114. DOI: 10.1016/s0022-5347(17)51946-1
5. Bevers R.F., Abbekerk E.M., Boon T.A. Cowper's syringocele: symptoms, classification and treatment of an unappreciated problem // J Urol. 2000. Vol. 163, No. 3. P. 782–784. DOI: 10.1016/s0022-5347(05)67803-2
6. Melquist J., Sharma V., Sciuolo D., et al. Current diagnosis and management of syringocele: a review // Int Braz J Urol. 2010. Vol. 36, No. 1. P. 3–9. DOI: 10.1590/s1677-55382010000100002
7. Campobasso P., Schieven E., Fernandes E.C. Cowper's syringocele: an analysis of 15 consecutive cases // Arch Dis Child. 1996. Vol. 75, No. 1. P. 71–73. DOI: 10.1136/adc.75.1.71
8. Blas F., Rösch W.H., Koen M., et al. Cowper's syringocele: A rare differential diagnosis of infravesical obstruction in boys and young adults // J Pediatr Urol. 2017. Vol. 13, No. 1. P. 52.e1–52.e5. DOI: 10.1016/j.jpuro.2016.08.023
9. Selli C., Nesi G., Pellegrini G., et al. Cowper's gland duct cyst in an adult male. Radiological and clinical aspects // Scand J Urol Nephrol. 1997. Vol. 31, No. 3. P. 313–315. DOI: 10.3109/00365599709070358
10. Wu F., Park E., Udayasankar U. Cowper gland syringocele // J Urol. 2013. Vol. 190, No. 2. P. 713–714. DOI: 10.1016/j.juro.2013.04.079
11. Masson JC, Suhler A, Garbay B. Les canaux et glandes de Cowper. Manifestations pathologiques et aspects radiologiques // J Urol Nephrol (Paris). 1979. Vol. 85, No. 7–8. P. 497–511.
12. Awad M.A., Alwaal A., Harris C.R., et al. Transurethral Unroofing of a Symptomatic Imperforate Cowper's Syringocele in an Adult Male // Case Rep Urol. 2016. Vol. 2016. P. 3743607. DOI: 10.1155/2016/3743607
13. Piedrahita Y.K., Palmer J.S. Case report: Cowper's syringocele treated with Holmium: YAG laser // J Endourol. 2006. Vol. 20, No. 9. P. 677–678. DOI: 10.1089/end.2006.20.677
14. Santin B.J., Pewitt E.B. Cowper's duct ligation for treatment of dysuria associated with Cowper's syringocele treated previously with transurethral unroofing // Urology. 2009. Vol. 73, No. 3. P. 681. e11–13. DOI: 10.1016/j.urol.2008.03.020
15. Redman J.F., Rountree G.A. Pronounced dilatation of Cowper's gland duct manifest as a perineal mass: a recommendation for management // J Urol. 1988. Vol. 139, No. 1. P. 87–88. DOI: 10.1016/s0022-5347(17)42301-9
16. Cerqueira M., Xambre L., Silva V., et al. Siringocele imperforado de las glándulas de Cowper. Tratamiento por vía laparoscópica // Actas Urol Esp. 2004. Vol. 28, No. 7. P. 535–538. DOI: 10.1016/s0210-4806(04)73125-3
17. Yamada T., Nakane K., Kanimoto Y. Successful treatment by transperineal percutaneous sclerosis with minocycline hydrochloride for imperforate Cowper's syringocele in a young man // Int J Urol. 2009. Vol. 16, No. 9. P. 771. DOI: 10.1111/j.1442-2042.2009.02362.x

REFERENCES

1. Cowper W. An Account of Two Glands and Their Excretory Ducts Lately Discover'd in Human Bodies. The Royal Society. 1699;364–369.
2. Gajvoronskij IV. *Normal'naja anatomija cheloveka. 7 edition.* Saint Petersburg, SpecLit; 2011. 423 p. (In Russ.)
3. Wein A, Kavoussi L, Partin A, Peters C. *Campbell-Walsh Urology. 11 ed.* Elsevier; 2015. 4186 p.
4. Maizels M, Stephens FD, King LR, Firlit CF. Cowper's syringocele: a classification of dilatations of Cowper's gland duct based upon clinical characteristics of 8 boys. *J Urol.* 1983;129(1):111–114. DOI: 10.1016/s0022-5347(17)51946-1
5. Bevers RF, Abbekerk EM, Boon TA. Cowper's syringocele: symptoms, classification and treatment of an unappreciated problem. *J Urol.* 2000;163(3):782–784. DOI: 10.1016/s0022-5347(05)67803-2
6. Melquist J, Sharma V, Sciuolo D, et al. Current diagnosis and management of syringocele: a review. *Int Braz J Urol.* 2010;36(1):3–9. DOI: 10.1590/s1677-55382010000100002

7. Campobasso P, Schieven E, Fernandes EC. Cowper's syringocele: an analysis of 15 consecutive cases. *Arch Dis Child*. 1996;75(1):71–73. DOI: 10.1136/adc.75.1.71
8. Blas F, Rösch WH, Koen M, et al. Cowper's syringocele: A rare differential diagnosis of infravesical obstruction in boys and young adults. *J Pediatr Urol*. 2017;13(1):52.e1–52.e5. DOI: 10.1016/j.jpuro.2016.08.023
9. Selli C, Nesi G, Pellegrini G, et al. Cowper's gland duct cyst in an adult male. Radiological and clinical aspects. *Scand J Urol Nephrol*. 1997;31(3):313–315. DOI: 10.3109/00365599709070358
10. Wu F, Park E, Udayasankar U. Cowper gland syringocele. *J Urol*. 2013;190(2):713–714. DOI: 10.1016/j.juro.2013.04.079
11. Masson JC, Suhler A, Garbay B. Cowper's canals and glands. Pathological manifestations and radiologic aspects. *J Urol Nephrol (Paris)*. 1979;85(7–8):497–511.
12. Awad MA, Alwaal A, Harris CR, et al. Transurethral Unroofing of a Symptomatic Imperforate Cowper's Syringocele in an Adult Male. *Case Rep Urol*. 2016;2016:3743607. DOI: 10.1155/2016/3743607
13. Piedrahita YK, Palmer JS. Case report: Cowper's syringocele treated with Holmium: YAG laser. *J Endourol*. 2006;20(9):677–678. DOI: 10.1089/end.2006.20.677
14. Santin BJ, Pewitt EB. Cowper's duct ligation for treatment of dysuria associated with Cowper's syringocele treated previously with transurethral unroofing. *Urology*. 2009;73(3):681.e11–13. DOI: 10.1016/j.urology.2008.03.020
15. Redman JF, Rountree GA. Pronounced dilatation of Cowper's gland duct manifest as a perineal mass: a recommendation for management. *J Urol*. 1988;139(1):87–88. DOI: 10.1016/s0022-5347(17)42301-9
16. Cerqueira M, Xambre L, Silva V, et al. Imperforate syringocele of the Cowper's glands laparoscopic treatment. *Actas Urol Esp*. 2004;28(7):535–538. DOI: 10.1016/s0210-4806(04)73125-3
17. Yamada T, Nakane K, Kanimoto Y. Successful treatment by transperineal percutaneous sclerosis with minocycline hydrochloride for imperforate Cowper's syringocele in a young man. *Int J Urol*. 2009;16(9):771. DOI: 10.1111/j.1442-2042.2009.02362.x

ОБ АВТОРАХ

***Сергей Медгарович Гозалишвили**, врач-онколог;
адрес: Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Академика
Лебедева, д. 6; eLibrary SPIN: 8838-2460; e-mail: gozalishwili@mail.ru

Владимир Владимирович Протошак, д-р мед. наук,
профессор, главный уролог Министерства обороны РФ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1897-8894>;
eLibrary SPIN: 6289-4250; e-mail: protoshakurology@mail.ru

Алексей Анатольевич Сиваков, канд. мед. наук;
eLibrary SPIN: 3064-8134; e-mail: alexei-sivakov@mail.ru.

Василий Кириллович Карандашов, заведующий
онкологическим отделением клиники урологии;
e-mail: karandashov_vk@mail.ru

Александр Евгеньевич Горбунов, врач-уролог;
eLibrary SPIN: 4863-3123; e-mail: vmaaaa@yandex.ru.

AUTHORS INFO

***Sergej M. Gozalishvili**, Oncologist; 6 Akademika Lebedeva str.,
Saint Petersburg, 6194044, Russia; eLibrary SPIN: 8838-2460;
e-mail: gozalishwili@mail.ru.

Vladimir V. Protoshchak, Doc. Sci. (Med.), Professor;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1897-8894>;
eLibrary SPIN: 6289-4250; e-mail: protoshakurology@mail.ru.

Aleksei A. Sivakov, Cand. Sci. (Med.); eLibrary SPIN: 3064-8134;
e-mail: alexei-sivakov@mail.ru.

Vasilii K. Karandashov, Head of Oncological Unit of Urological
Clinic; e-mail: karandashov_vk@mail.ru.

Alexandr E. Gorbunov, Urologist; eLibrary SPIN: 4863-3123;
E-mail: vmaaaa@yandex.ru