

## ПРИЛОЖЕНИЕ / APPENDIX

№	Фактор риска	Баллы
1	Локализация анастомоза	
	• ниже 7 см от ануса	5
	• на расстоянии 7–10 см от ануса	2
2	Заболевания кишки и состояния, сопровождающиеся воспалительным процессом в стенке кишки	
	• активный воспалительный процесс	5
	• хронические воспалительные заболевания, вне обострения	2
3	Трудности при формировании анастомоза, способные привести к развитию нарушения трофики в зоне анастомоза (недостаточная мобилизация соединяемых отделов кишки, нарушение кровоснабжения в зоне анастомоза при мобилизации, попадание кишечного содержимого в операционное поле при формировании анастомоза)	
	• есть	5
	• нет	0
4	Пол	
	• мужской	2
	• женский	0
5	Значительная кровопотеря во время операции без восполнения путем гемотрансфузии. Снижение уровня гемоглобина	
	• на 30 г/л и более	2
	• на 16–30 г/л	1
	• менее чем на 16 г/л	0
6	Гипопротеинемия	
	• есть	2
	• нет	0
7	Гипоальбуминемия	
	• есть	2
	• нет	0
8	Заболевания сердечно-сосудистой системы, приводящие к развитию нарушения микроциркуляции в органах и тканях (гиалиноз стенок артериол при гипертензии высокой степени тяжести)	
	• есть	1
	• нет	0
9	Портальная гипертензия	
	• есть	1
	• нет	0
10	Дегидратация	
	• есть	1
	• нет	0
11	Гидропневматическая (воздушная) проба	
	• положительная	13
	• не проведена	2
	• отрицательная	0

*Примечание.* При сумме баллов 13 и более показано формирование превентивной стомы.